

Итоговый экзамен 1

1-2. 68-ми летний мужчина с жалобами на водную диарею, спастические боли в животе с метеоризмом и небольшой лихорадкой в течение 3-х дней. 10 дней назад ему была проведена операция АКШ, на 5-й послеоперационный день был назначен цефалоспорин 1-го поколения по поводу целлюлита раны. Физ. обследование выявило T100, P95, АД 110/60, ЧД12 и умеренно вздутый живот с умеренной болью в левом нижнем квадранте, умеренно болезненный, без иррадиации и на ректальном обследовании + проба на кровь в стуле. Лаб. данные: повышенный BUN и креатинин, лейкоцитоз 25000. Диагностика:

- А. Рентген груди и живота
- Б. Стул на яйца глист и паразитов
- С. Стул на токсины *Clostridium difficile*
- Д. Стул на энтеротоксигенную *E. Coli*
- У. СТ живота

Ответ:С

1. Лечение:

- А. В/в жидкости в приемном отделении и выписать домой на оральный цефалоспорин с рекомендациями вернуться при нарастании симптоматики или T более 101,5
- Б. В/в жидкости, госпитализация и назначение цефалоспоринов 3-го поколения
- С. В/в жидкости, госпитализация, прекращение приема цефалоспоринов и колоноскопия
- Д. В/в жидкости, госпитализация, прекращение приема цефалоспоринов и метронидазол
- Е. В/в жидкости в приемном отделении и выписать домой на оральный цефалоспорин с рекомендациями вернуться для постановки бариевой клизмы

Ответ:Д

2. 40-о летний мужчина позвонил в Ваш офис с вопросом о результатах рентгена. Он волнуется, т.к. у его друга только что обнаружен рак легкого. Он и его друг выкуривают 2 пачки сигарет в день и имеют хронический кашель. Он редко посещал врача до тех пор пока серьезно не заболел. Вы назначили пациенту рентген и он нормальный. Ваши действия?

- А. Посоветовать пройти СТ, т.к. рентген часто пропускает ранние стадии рака
- Б. Усилить его тревогу показом снимков жертв рака лёгких и эмфиземы
- С. Оценить его готовность бросить курить
- Д. Объяснить ему что курение в 15 раз чаще приводит к раку лёгких
- Е. Посоветовать ему бросить курить сейчас
- Ф. Назначить ему визит в офис чтобы больше изучить его и помочь ему бросить курить

Ответ:Е

5-7. 22-ух летний студент колледжа оцнивается у психиатра из-за начала параноидного бреда, приказывающих слуховых галлюцинаций и ощущения, что его мысли высасываются из мозга отриц. электромагнитными волнами. Нет предыдущего псих. анамнеза. Его родители сообщили, что 2 месяца назад, вернувшись домой он изолировался в комнате и стал неаккуратен к внешнему виду. Он был описан как тихий, но дружелюбный человек с несколькими хорошими друзьями. В старших классах и колледже, исключая последние 2-3 месяца он был хорошим студентом и наслаждался учёбой, играл в соккер и занимался лёгкой атлетикой. Он волновался за образование и дальнейший поиск работы. Пациент отрицает применение галлюциногенов. Дядя с отцовской линии страдал шизоф.

5.Первичное лечение:

- А. Бушпирон
- Б. Бупропион
- С. Флювоксамин
- Д. Кломипрамин
- Е. Квитотиапин

Ответ:Е

6. Его опасения о высасывании мыслей пример:
- А. Проекция
 - Б. Потери ассоциаций
 - С. Бред
 - Д. Галлюцинаций
 - Е. Высокой чувствительности к факторам внешней среды

Ответ:С

7. Что из следующего указывает на хороший прогноз для мужчины?
- А. Дядя с шизой
 - Б. Хорошее обучение в школе
 - С. Одиночество
 - Д. Внезапное начало
 - Е. Нет четких провоцирующих факторов

Ответ:Б?

8. Рабочий жалуется на парестезии, онемение и покалывание, начавшиеся дистально в ногах и начавшие поражать и руки. Развилась мм слабость. ЭМГ показало аксональную дегенерацию и демиелинизаци. Что обусловило симптоматику?
- А. Свинец
 - Б. Гексан
 - С. Бензин
 - Д. Кадмий
 - Е. Дисульфид углерода
 - Ф. Вибрация
 - Г. Полихлорированные диоксины

Ответ:Б

9. Бездетная 59-ти летняя женщина с 3-х дневным вагинальным кровотечением месяц назад, первый эпизод кровотечения со времени менопаузы в 53 года. В анамнезе алкогольный цирроз. Ее индекс массы тела- 32. Она получает комбинированную заместительную терапию эстроген- прогестиновую. У нее сейчас 3 половых партнера. Ее исследование таза нормальное, ПАП мазок нормальный. Диагностика:
- А. Эндометриальная биопсия
 - Б. Кольпоскопия
 - С. Трансвагинальное УЗИ
 - Д. Измерение сыв. Са-125
 - Е. Вагинальная гистерэктомия

Ответ:А

10. Что не является риск фактором для эндометриальной карциномы?
- А. Малое кол-во родов в анамнезе
 - Б. Цирроз печени
 - С. Индекс массы тела 32
 - Д. Большое кол-во сексуальных партнеров
 - Е. Поздняя менопауза

Ответ:Д

11-12. 17-ти летняя женщина с СД 1-го типа поступила с суточной историей тошноты и рвоты. Она не завтракала и не обедала и не принимала сегодня инсулин. Газы артериальной крови: рН 7.05, рСО₂ 12, рО₂ 108. Витальные признаки: АД 140/60, Р 126, ЧД 30. Электролиты: натрий 149, хлор 117, BUN 42. HCO₃ 8, хром 2.1, К 5.4, глюкоза 140.

11. Первичное нарушение водно электролитного баланса:

- А. Респираторный ацидоз
- Б. Респираторный алкалоз
- С. Метаболический ацидоз
- Д. Метаболический алкалоз
- Е. Метаболический баланс

Ответ:С

12. Источником нарушения : водно электролитного баланса

- А. Аспирин
- Б. Кетоны
- С. Метанол
- Д. Изониазид
- Е. Глюкоза

Ответ:Б

13-16. 22-х летний мужчина с жалобами на впервые возникший узелок в шее месяц назад. Он старший из 8 детей в возрасте от 8 до 22 лет. В семейном анамнезе рак щитовидки, ГБ у деда и бабки по папиной линии и опухоль неизвестной этиологии у отца , ныне скончавшегося. На обследовании у него нормальный внешний вид и пропорции тела. Он афебрилен, АД 145/90 и Р 70. Исследование шеи выявило твердый 2-х см узел в щитовидке, Тонкоигольная аспирация узла выявила тироидную карциному.

13. Тип карциномы:

- А. Папиллярная
- Б. Фолликулярная
- С. Клеток Хюртля
- Д. Медуллярная
- Е. Анапластическая

Ответ:Д

14. Какой скрининг должен быть проведен перед лечением рака щитовидки:

- А. АКТГ- продуцирующей опухоли
- Б. С-ма Золлингера-Эллисона
- С. Аденомы гипофиза
- Д. Феохромоцитомы
- Е. Ганглиофибромы

Ответ:Д

15. Что является минимальным лечением для данного пациента:

- А. Ипсилатеральная субтотальная лобэктомия
- Б. Ипсилатеральная лобэктомия и истмэктомия
- С. Субтотальная тироидэктомия и истмэктомия
- Д. Тотальная тироидэктомия
- Е. Тотальная тироидэктомия и паратироидэктомия

Ответ:Д

16. Скрининг аномалий каких протоонкогенов должен быть предложен его сиблингам:

- A. Muc
- B. ret
- C. ras
- D. myb
- E. erbB

Ответ:Б

17. Частный терапевт направил недавно девочку на исследование хлоридов пота из-за опасения, что у не муковисцидоз. Тест был +. Она была направлена на дальнейшее диагностическое тестирование и консультирование. Она первый ребенок в женатой паре. Никто в семье не болел этой болезнью. Какой из следующих советов вы должны дать при вашем первичном общении с пациенткой и ее семьей:

- A. Потовый тест- скрининг, но следующие тесты должны быть сделаны чтоб подтвердить диагноз
- B. Легочные осложнения тяжелые , но не типичны
- C. Толерантность к глюкозе типична для 1-го года жизни
- D. Терапия не обеспечивает излечения от брлезни, но может значительно продлить жизнь
- E. Болезнь четко генетическая, но не известно аутосомная или рецессивная

Ответ:Д

18. У больного с СД идеальный ЛНП- холестерол д.б.

- A. >100
- B. >130
- C. <130
- D. < 100
- E. >160

Ответ:Д

19. Какие из следующих препаратов будут полезны больному с СД + гипертензия + микроальбуминурия

- A. Метопролол
- B. Эналаприл
- C. Цеклонидин
- D. Нифедипин
- E. Ни одно

Ответ:Б

20. Пуэрториканская женщина, леченная от депрессии, начала вырывать из себя волосы. При ее оценке вы заметили, что ее ресницы редкие и ее волосы очень тонкие с участками отсутствия волос. Она повторно рвала волосы, но на момент осмотра не делала этого. Она сообщила, что ведет себя таким образом около года. Это состояние известно как:

- A. Кататоническая шизофрения, возбужденная форма
- B. Трихотилломания
- C. Поиск призраков
- D. MAL DE O J O
- E. Аутизм

Ответ:Б

21. Б-нь Бюргера характеризуется:
- А. Типична для курильщиков
 - Б. Чаще у молодых женщин
 - С. Поражает крупные артерии
 - Д. Не вовлекает вены
 - Е. Наиболее часто в южной части США

Ответ:А

22. У 29-ти летней женщины с неосложненной беременностью на 42-ой неделе гестации были индуцированы роды в/в введением окситоцина. Роды без осложнений. Все является потенциальным осложнением перенесенной беременности, кроме:
- А. Олигогидрамнион
 - Б. Макросомия
 - С. Аспирация меконием
 - Д. Плацентарная недостаточность
 - Е. Ягодичное предлежание

Ответ:Е

23. У 22-ух летней нерожавшей были ежемесячно месячные без боли до 18-ти месяцев назад. В последние 18 месяцев отмечены прогрессивно болезненные месячные из-за чего она пропускала 2 рабочих дня в месяц. Нет поражения ЖКТ или МПС. Она девственница без анамнеза гин. операций. Боль частично облегчается приемом НПВС. Причина вторичной дисменореи:
- А. Эндометриоз
 - Б. Тазовая инфекция и спайки
 - С. Застой в малом тазу
 - Д. Цервикальный стеноз
 - Е. С-м раздраженного кишечника

Ответ:А

24. 23-х летняя женщина с + LCR реакцией на хламидии. 8 недель беременности. След. шаг:
- А. 4-х дневный курс азитромицина
 - Б. 7-ми дневный курс доксициклина
 - С. Курс амоксициллина или эритромицина
 - Д. Культуру для подтверждения д-за и определения чувствительности организма перед началом лечения
 - Е. ПЦР для подтверждения д-за перед началом лечения

Ответ:С

- 25-26. 25-ти летняя женщина с 2-ух недельной историей боли в правой груди. Боль локализована в области соска и ареолы и окружающей кожей и связана с покраснением и припуханием. Боль не изменяется в зависимости от мен. цикла. На обследовании витальные признаки в норме, есть индурация, эритема и болезненность вовлеченного соска и ареолы груди с субареолярной массой. Ипсилатеральные подмышечные узлы слегка болезненны. На УЗИ наличие жидкости в области субареолярного комплекса.

25. Диагноз?

- А. Воспалительная карцинома груди
- Б. Околопротоковый мастит с абсцессом
- С. Б-нь Педжета
- Д. Б-нь Мондора
- Е. Внутрипротоковая папиллома

Ответ:Б

26. Следующий шаг в лечении?

- А. Аспирация жидкости и антибиотики
- Б. Центральная люмпэктомия, диссекция аксиллярных лимфоузлов и радиотерапия
- С. Инцизия и дренаж
- Д. Антибиотики с повторной оценкой через 1 неделю
- Е. Экцизионная биопсия

Ответ:А

27. 24-х летняя Б2Р2 женщина вступила в половую связь без предохранения на 14-й день цикла. Через 2 дня она попросила немедленной контрацепции. Наилучшая контрацепция:

- А. Один трёхфазный ПОК
- Б. Метотрексат- 50, в/м
- С. ДЭС 5 мг орально 1 раз
- Д. Даназол 200 мг орально 1 раз
- Е. Оврал, 2 таб.дважды через 12 часов

Ответ:Е

28. Тошая, белая 53-х летняя женщина с последними месячными 2 года назад жалуется на приливы в течение года, сухости вагины и бессоницы из-за ночных потов. Вы предложили ЗГТ эстроген-прогестероновую, объясняя это тем, что:

- А. Повысит риск рака эндометрия
- Б. Повысит риск рака груди
- С. Повысит оргазмическую способность
- Д. Повысит минерализацию кости
- Е. Повысит риск рака колона

Ответ:Б

29. 12-ти летний ранее здоровый ребенок с 3-х дневной лихорадкой и затем снижением Т и появлением макулопапулярной сыпи на туловище без другой симптоматики. Диагноз:

- А. 5-ая болезнь
- Б. Б-нь Kawasaki
- С. Детская розеола
- Д. Корь
- Е. Скарлатина

Ответ:С

30. Что из следующего будет наиболее полезным в терапии неизлечимого больного?

- А. Скрывать информацию о прогнозе и лечении побочных эффектов чтобы не травмировать пациента
- Б. Спросить пациента насколько много он хочет знать о своём заболевании
- С. Убедить родственников больного обеспечивать ему эмоциональную поддержку
- Д. Анальгетики регулярно
- Е. Не пользоваться групповой терапией

Ответ:Д

31. Чем лучше всего описывается суицид и суицидальное поведение?

- А. Шизофреники наиболее склонны к суициду в период острого психоза
- Б. Психол. риск факторы суицида высокоспецифичны, но низко чувствительны

- С. Нейробиология коррелирует суицидальное поведение как сильное у лиц с суицидальными мыслями чем у лиц с неудавшимися попытками суицида
 Д. Люди с неудачной попыткой суицида имеют тенденцию быть старше и менее бактериологически поражены чем лица намеревающие совершить суицид
 Е. Повышение серотонергических функций коррелирует с повышенным риском суицида

Ответ:Д

39. 25-ти летняя нерожавшая консультируется по поводу аменореи. Ее месячные были ежемесячно до последнего года, когда уменьшилась их частота. Она также жалуется на приливы, сухость вагины и дискомфорт при половых контактах. Первый шаг в диагностике:
 А. Концентрация суточного ТСГ
 Б. Пролактин
 С. ХГЧ
 Д. Эстрадиол-17
 Е. Тестостерон

Ответ:С

40. Все является противопоказанием для приема контрацептивов у 37-ми летней женщины, кроме:
 А. Цирроз с нарушенной функцией печени
 Б. Предыдущая, вызванная беременностью гипертония
 С. История венозной ТЭ
 Д. Курение
 Е. Мигрень

Ответ:Б

41. Родители ребенка, рожденного в срок, беспокоятся о возможности у него дисплазии бедра. Что из анамнеза делает этот диагноз вероятным:
 А. Мужской пол
 Б. Ягодичное предлежание при родах
 С. Вагинальные роды
 Д. Ребенок 3-й в семье
 Е. Семья афроамериканцев

Ответ:Б

42. 25-ти летний мужчина госпитализирован после недели ухудшения психоза. Он начал принимать тиоксетин. Через 5 дней у него развилась Т 38, У него развился делирий, он неподвижно лежит в кровати и не общается. Его семья сообщила, что он был здоров во время приема препарата, что было подтверждено физикальным обследованием. Диагноз:
 А. Ухудшение психотического статуса
 Б. Псевдопаркинсонизм
 С. Разорвавшаяся мозговая аневризма
 Д. Скрытая опиоидная зависимость
 Е. Нейролептический злокачественный синдром

Ответ:Е

43. У вас на обследовании 30-ти летняя женщина с + повторным тестом на хламидии NAA-тестом с чувствительностью 90% и специфичностью 95%. Что вы скажете о возможности наличия у нее хламидий:
 А. Вы не можете сказать какая вероятность есть
 Б. 95%, что она есть

- С. 5% , что она есть
- Д. Вы не можете сказать без повторения теста
- Е. Для такого утверждения необходимо взять мазок крови и сделать ПЦР

Ответ:А

44-46. 22-х летний мужчина ранее здоровый, был спасен из горящего дома, где был заперт в маленькой спальне несколько часов. В реанимацию он прибыл возбужденный и дезориентированный. Легкие чистые с двух сторон. ЧД-30, АД 100/70, Р115. У него 15% поверхности тела повреждено, второй и третьей степени ожоги на ногах с круговым утолщенным, по всей окружности повреждению ниже правого колена.

44. Первый шаг в лечении:

- А. Седация с в/в мидазоламом
- Б. В/в морфин для анальгезии
- С. 100% O₂ через лицевую маску
- Д. ПХО ожогов на ногах
- Е. В/в жидкость болюсом 20 мл/кг

Ответ:С

Пациент улучшился и переведен в интенсивную терапию для дальнейшего лечения.

45. Соответствующая гидратация:

- А. В/в декстроза, 0,5 нормальный физр-р 150мл/ч
- Б. В/в Рингера лактат дважды в поддерживающей дозе за час, с альбумином в болюсе
- С. В/в Рингера лактат дважды в поддерживающей дозе за час
- Д. 4800 мл Рингера лактата, по 200 мл/ч
- Е. В/в инфузионная терапия + 4800 Рингера, половину даем за первые 8 часов и остаток за 16 часов.

Ответ:Е

Через несколько часов терапии пациент начал жаловаться на боли в правой стопе и лодыжке, сниженное капиллярное наполнение правого большого пальца и снижение чувствительности.

46. Лечение выбора:

- А. Подъём пораженной конечности
- Б. Антибиотики
- С. ГБО
- Д. 100% масочный O₂
- Е. Иссечение струпа

Ответ:Е

47. 55-ти летняя женщина отказалась принимать гормонзаместительную терапию, потому что она боится, что у нее разовьётся рак груди. Вы предполагаете назначить её селективный модулятор эстрогеновых рецепторов- ралоксифен. Какие из следующих утверждений поддерживают Ваш выбор?

- А. Плотность кости повышается через 24 часа
- Б. ЛВП повышается через 6 месяцев
- С. Облегчаются приливы
- Д. Нарастает толщина эндометрия через 12 месяцев
- Е. Возрастает риск развития рака груди

Ответ:А

48. 15-ти летняя девочка поступила через 4 часа после приема аспирина. Она приняла примерно 150 мг/кг аспирина. Физ. обследование в норме. Лечение:

- А. Вызвать рвоту
- Б. Ацетилцистеин
- С. Слабительное
- Д. В/в жидкости для увеличения диуреза
- Е. Нет необходимости в мед. вмешательстве

Ответ:Д

49. Асимптоматическая сексуально активная женщина меньше 25-ти лет для взятия ПАП-мазка. Она также интересуется необходимостью провериться на хламидии и Ваш ответ:

- А. Рекомендовано провериться и на хламидии
- Б. Она должна пройти исследование на наличие хламидий
- С. Есть смысл провериться если пациентка беременная
- Д. Не рекомендовано
- Е. Нет определенных преимуществ

Ответ:А

50. 50-ти летняя женщина со слабостью правой кисти, сопровождающейся покалыванием при вставании каждое утро. У нее гипостезия большого пальца, указательного пальца и средних пальцев с атрофией мм тенара. Диагноз- компрессия:

- А. Пальцевого нерва большого пальца
- Б. Срединного нерва в кисти
- С. Срединного нерва в карпальном туннеле
- Д. Срединного нерва круглым пронатором
- Е. Срединного нерва в подмышке

Ответ:С

51.24-х летняя первобеременная получает магнезию из-за преэклампсии и окситоцин для индукции родов на 39-й неделе гестации. Роды без особенностей до 1 часа после родов когда началось тяжелое послеродовое кровотечение которое потребовало интенсивного массажа дна и эрготамина для контроля кровотечения.. Хотя она хотела покормить грудью сына, она не смогла этого сделать из-за отсутствия у нее молока. Через 6 месяцев она у Вас с аменореей, начавшейся с родов. Диагноз:

- А. СПЯ
- Б. Раннее повреждение функции яичников
- С. С-м Ашермана
- Д. Цервикальный стеноз
- Е. С-м Шихана

Ответ:Е

52. 2-ух летний ребенок, начинающий ходить отказывается двигать левой рукой и держит её согнутой в локте с пронированным предплечьем. Папа крутил его держа за предплечья, нет другой истории травмы. Диагноз:

- А. Перелом ключицы
- Б. 4-й тип Сальтеровского перелома дистального плеча
- С. Вывих головки луча
- Д. Компрессионный веретенообразный перелом дисального луча
- Е. Контузия локтевого нерва

Ответ:С

53. 14-ий мальчик с акне. На обследовании акне на лице и стадия развития по Таннеру 3. Лечение:

- А. Тщательно мыть лицо 4 раза в день
- Б. Это пройдет по мере прогрессирования пубертата
- С. Меньше употреблять шоколада, крахмала, маслянистой или жареной еды
- Д. Не нужно лечения до развития кистозных акне
- Е. Лечить местно бензоил пероксидом и третиноином

Ответ:Е

54. Что является наиболее частой причиной синкопе?

- А. Психиатрические б-ни
- Б. Аритмии
- С. Неврологические
- Д. Прием медикаментов
- Е. Гастроинтестинальные

Ответ:С

55. В 1990 году было проведено исследование, чтобы определить соотношение между наружным загрязнением воздуха и бронхитами у почтовых работников за период 1970-1980. Информация о бронхитах была собрана из медицинских записей 2500 дел почтовых работников, работавших наружу, и 500 работников, работавших снаружи зданий. Риск бронхита оказался выше у тех, кто работал снаружи. Цель исследования:

- А. Исследование экологии
- Б. Исследование истории
- С. Исследование поперечного среза населения
- Д. Проспективное исследование
- Е. Рандомизированное исследование

Ответ:Б

56. 19-ти летний студент университета госпитализирован с внезапным началом лихорадки, головной болью и ригидностью шеи фотофобией. У него вскоре развилась распространенная пурпурная сыпь и он стал спокойнее. Исследование СМЖ выявило большое кол-во Грам+ диплококков. В течение 3-х дней двое других студентов были госпитализированы со сходной симптоматикой и СМЖ. Один из студентов присутствовал на семинаре с первым студентом, а третий не имел контактов с другими заболевшими. Вы офицер общественного здоровья в этом районе, и руководитель школы просит вас дать совет. Осталось 2 месяца занятий. Лучшими рекомендациями будут:

- А. Рифампин 500 мг 2 р/день 2 дня всем студентам и учителям
- Б. Закрыть школу и послать студентов по домам
- С. Провести массовую иммунизацию от менингита
- Д. Выявить источник инфекции, используя методы экспресс- диагностики
- Е. Провести кампанию в средствах массовой информации о признаках и симптомах менингита

Ответ:С

57-58. 26-ти летний ранее здоровый мужчина поступил с ножевым ранением в 5-м левом межреберье по средне-ключичной линии. Р-140, СКД 80, ЧД-20. Трахея по средней линии. Тоны сердца приглушены и дыхательные шумы одинаковы с двух сторон.

57. Диагноз:

- А. Рассечение нисходящей аорты
- Б. Тампонада сердца
- С. Массивный левосторонний гемоторакс
- Д. Напряженный пневмоторакс
- Е. Паралич диафрагмального нерва

Ответ:Б

58. Лечение:

- А. Дренаж в левую грудную полость
- Б. Торакотомия
- С. Перикардиоцентез
- Д. Болюсное в/в введение жидкости
- Е. Интубация и ИВЛ

Ответ:С

59. Новорожденный родился от матери, леченой в конце беременности от первичного сифилиса. После рождения ребенок оценивается на наличие врожденного сифилиса. Какие из следующих утверждений верны:

- А. Средний вес ребенка повысится из-за водянки плода
- Б. Врожденный сифилис наиболее характерен, если у матери поздний сифилис, нежели первичный
- С. Уровень мертворождения значительно повышается
- Д. Наличие врожденного сифилиса видно при рождении
- Е. Ложно-отрицательные серо-тесты на сифилис часты у ВИЧ+ женщин

Ответ:С

60. У пациентки было неосложненное кесарево сечение 6 дней назад. Она получала клиндамицин, гентамицин, ампициллин 5 дней, но Т все еще 39,4. Физ. обследование в норме. Причина лихорадки:

- А. Тазовый абсцесс
 - Б. Септический тромбоз вен таза
 - С. Эндометрит
 - Д. Пиелонефрит
 - Е. Застой в груди
- Ответ:Б

61. В течение вечера 10 человек поступили в больницу с жалобами на резко начавшуюся сильную тошноту, рвоту и спастические боли в животе. Многие были в пространии с потами и головокружением. У некоторых была диарея. На обследовании они афебрильны. У всех их симптомы начались через 1-3 часа после еды в одном и том же ресторане. И все они ели барбекю из фарша из ресторанного буфета. Департамент здоровья провел проверку на следующий день. Что из найденного наиболее ассоциируется с болезнью:

- А. История рвоты и диареи у повара готовившего барбекю
 - Б. Неадекватное разогревание предварительно замороженной пищи
 - С. Инфицированные порезы на кистях повара готовившего барбекю
 - Д. Вспышка гастроэнтерита у ресторанной obsługi неделю назад
 - Е. Мясо для барбекю пришедшее от поставщика, ранее замеченного в поставках товара, после которого были вспышки E.coli O157: H7
- Ответ:С

62. 17-ти летняя девушка поступила после употребления витаминов , содержащих железо. С-мы ранней стадии острого отравления железом:

- А. Геморрагический диатез
 - Б. Кровотечение из ЖКТ
 - С. Печеночная недостаточность
 - Д. Удлинение интервала Q-T
 - Е. ДН
- Ответ:Б

63. 12-ти летняя девочка со слабостью , вялостью, болью в горле, лихорадкой, гепатоспленомегалией, генерализованной лимфаденопатией. Диагностирован инфекционный мононуклеоз. Какое наиболее вероятное осложнение:

- А. Азотемия
 - Б. Хр. активный гепатит
 - С. Энцефалит
 - Д. Лейкопения
 - Е. Панкреатит
- Ответ:С

64. 55-ти летняя женщина на консультации у психиатра по поводу депрессии. Она через 60 дней после трансплантации костного мозга. Ее муж сообщил, что она только плачет, мало говорит, спит очень мало и потеряла интерес к нему и к детям , также как к домашней работе и хобби. Онколог, который послал ее к вам, просит дать ей что-нибудь против депрессии. Следующий шаг:

- А. Сертолин
 - Б. Лоразепам
 - С. Интервьюировать женщину
 - Д. Собрать семейный совет
 - Е. ЭСТ
- Ответ:С

65. Какие из следующих утверждений о суицидах у детей истинны:

- А. Его частота стабильна среди нации
 - Б. Импульсивные дети более частые жертвы
 - С. Дети после физ. насилия менее вероятные жертвы
 - Д. Дети до 14 лет не имеют суицидальных мыслей
 - Е. Это редкая причина смерти среди подростков
- Ответ:Б

66. Назовите побочный эффект цисплатины:

- А. Почечная токсичность
- Б. Лейкопения
- С. Атопический дерматит
- Д. Гемморагический цистит
- Е. Снижение зрения

Ответ:А

67. Главное различие в методологии 2-го вопроса Профилактического Сервиса Task Force и 3-го в том, что 3-й вопрос включает в себя:

- А. Находки основанные на очевидных фактах
- Б. Анализ эффективности стоимости
- С. Исходы
- Д. Рекомендации для асимтоматичных лиц
- Е. Превентивные меры инициированные клиникой

Ответ: Б

68. 19-ти летняя первородка на 38-й неделе гестации с АД150/106, гиперрефлексией и протеинурией 3+. Что из следующего верно?

- А. Риск эклампсии повышается с повышением СКД
- Б. Рождение ребенка- лечение для этой женщины
- С. Бета блокеры противопоказаны при беременности
- Д. Риск приращения плаценты повышаются у этих женщин
- Е. Перинатальная смертность умеренно повышается у беременных с гипертензией

Ответ:Б

69. После 12-ти часовой 1-й стадии, 45-ти минутной 2-ой стадии и 10-ти минутной третьей стадии родов здоровая первородка родила 7,9 фунтового мальчика с 9 по шкале Апгар на 1, 10 и 5-й минутах. Верные утверждение о родах?

- А. Родами считается присутствие регулярных маточных схваток с 5-ти минутными интервалами или меньше
- Б. Первая стадия начинается с началом регулярных схваток и заканчивается полным открытием шейки
- С. Первая стадия родов пролонгирована у этой женщины
- Д. Вторая стадия от полного раскрытия шейки до рождения плаценты
- Е. 3-ая стадия родов начинается после рождения плаценты и заканчивается эпизиотомией

Ответ:Б

70. Что верно о паклитакселе(Таксоле)?

- А. Получают из корней западного тиса
- Б. Миелосупрессия это главный дозограничивающий эффект
- С. Препятствует микротубулярному накоплению
- Д. Для лечения применяют распространенного рака шейки
- Е. Тошнота и рвота- нехарактерные побочные эффекты

Ответ:Б

71. HEDIS служат для:

- А. Регистрации б-ней печени
- Б. Сведения о здоровье работающих и информационные установки
- С. Регистрация здоровья и болезни
- Д. Оценки здоровья и выявления случаев болезни
- Е. Эпидемиологии здоровья и обследований для сбора информации о болезнях

Ответ:Б

72. 19-ти летняя Б1 с последними месячными 9 недель назад обратилась с тяжелым вагинальным кровотечением и спастические боли внизу живота в последние 3 часа. АД 146/96, P84. Абдоминальная масса внизу живота пальпируется на середине расстояния между симфизом и пупком. Шейка закрыта и есть активное кровотечение через зев. На бимануальном исследовании матка –на 16 недель беременности. Сердечные тоны плода

не слышны и плод не виден на УЗИ. ХГЧ- 80000, что отчетливо выше нормы для 9-ти недель. Диагноз:

- А. Многоплодие
 - Б. Трубная беременность
 - С. Погибшая яйцеклетка
 - Д. Одноплодная беременность в миоматозной матке
 - Е. Пузырный занос
- Ответ:Е

73. 5-ти месячный ребенок с историей 2-ух дневной ринореи и 1-но дневной лихорадки и ухудшающегося кашля. Ранее был здоров и не имел схожих симптомов. Физ. обследование-инспираторный стрidor. Что важно в диф.диагностике?

- А. Острый бронхит
 - Б. Острый ларинготрахеобронхит
 - С. Инородное тело в ВДП
 - Д. Ларингомалация
 - Е. Перитонзиллярный абсцесс
- Ответ:Б

74. 2-ух недельный инфант поступил с 1-но дневной рвотой. На физ. обследовании ребенок летаргичен, с плохой перфузией и умеренно дегидратирован. Электролиты: Сода-115, К-6, СО2-15. Диагноз?

- А. Врожденная адренальная гиперплазия
 - Б. Дуоденальная атрезия
 - С. Гастроэнтерит
 - Д. Пилоростеноз
 - Е. Трахеозофагеальная фистула
- Ответ:А

75. Вы в торговом центре и заметили 2-х людей возле мусорного контейнера. Один лежит на земле с произвольными мм сокращениями. Другой- на его коленях, в очевидном физ.дистрессе, включая затруднение дыхания и с начавшимися произвольными сокращениями конечностей. Что делать?

- А. Позвать на помощь, послать кого-то набрать 911, проверить воздухоносные пути, дыхание и пульс
 - Б. Сначала проверить воздухоносные пути, дыхание и пульс, затем позвать на помощь и звонить 911
 - С. Звонить 911, затем проверить воздухоносные пути, дыхание и пульс
 - Д. Оставить их на месте, попросить всех уйти, уйти самому и набрать 911
 - Е. Если возможно быстро перенести их в защищенную зону где они м.б. лечены без вмешательства постороннего
- Ответ:Д

76. Наиболее показательный тест на умственные способности ребенка:

- А. Стэнфорд-Бинет
 - Б. Metropolitan Achievement Test
 - С. Wechsler Intelligence Scale for Children
 - Д. Bellevue-Wechsler Scale
 - Е. Vineland Social Maturity Scale
- Ответ:С

79. 16-ти летняя девочка прибыла в клинику для проверки. Ее родители беспокоятся о ее весе. За последний год она потеряла 20 фунтов. Она не болела, она отличная студентка и активистка. На физ. обследовании она истощена, с гипотермией и брадикардией. Диагноз:

- А. Анорексия невроза
 - Б. Булимия
 - С. Гипертиреозидизм
 - Д. СД
 - Е. Депрессия
- Ответ:А

80. У ребенка ОЛЛ. Назовите хороший прогностический фактор при ОЛЛ в детстве:

- А. Возраст старше 7 лет
- Б. Женский пол
- С. Первично лейкоциты 10000
- Д. Наличие массы в средостении
- Е. Тромбоциты 100000

Ответ:С

81-82. 2-х летний мужчина приведен в госпиталь полицией. Они сообщили, что он нарушил службу в церкви- вошел и провозгласил, что он Иисус Христос. Вскоре вслед за этим пришла мать пациента и сообщила, что у сына был эпизод тяжелой депрессии 2 года назад, но не было таких выраженных симптомов, как сейчас. При обследовании пациента он говорил быстро, настаивая, что он мессия.

81. Диагноз:

- А. Биполярное расстройство 1 типа
- Б. Биполярное расстройство 2 типа
- С. Параноидная шизофрения
- Д. Гипертиреозидизм
- Е. Гипотиреозидизм

Ответ:А

82. Лечение:

- А. Вальпроевая кислота
- Б. Флюокситин
- С. Клоназепам
- Д. Бупропион
- Е. Венлафаксин

Ответ:А

83-85. 19-ти летняя никогда не менструировавшая женщина, хотя рост груди начался около 11 лет, а волосы на лобке появились через 6-12 месяцев. Семейный анамнез не показателен. АД 106/68, Р 68. Грудь и лобок на 5 стадии по Таннеру. Влагалище очень короткое и шейка не видна при осмотре в зеркалах. Матка не пальпируется несмотря на адекватное мануальное обследование.

83. Следующий шаг в оценке причин аменореи

- А. УЗИ таза
- Б. СТ гипофиза
- С. Лапароскопия
- Д. Эстрадиол сыворотки
- Е. Кариотип

Ответ:Е

84. Диагноз:

- А. Анорексия невроза
- Б. Дисгенезия гонад
- С. Агенезия Мюллеровых протоков
- Д. Тестикулярная феминизация
- Е. Дефицит 17-а- гидроксилазы

Ответ:С

85. Лечение:

- А. Хирургическое удаление гонад
- Б. Заместительная терапия эстрогеном
- С. Заместительная терапия эстрогеном и прогестинном
- Д. Заместительная терапия ГК
- Е. Создание влагалища

Ответ:Е

86. Какие из следующих нейролептически индуцированных условий могут быть значительно ухудшены приемом бензтропина

- А. Паркинсонизм
- Б. Окулогенный криз
- С. Ларингеальная дистония
- Д. Тремор
- Е. Задержка мочи

Ответ:Е

87. Какие из следующих факторов связаны с повышенным риском скрытой пневмококковой бактеремии у детей

- А. Нет изменений температуры после ацетаминофена
- Б. Л. меньше 15000
- С. Низкий социоэкономический статус
- Д. Температура выше 39
- Е. Возраст старше 2 лет

Ответ:Д

88. Какие из следующих утверждений о туберкулезном менингите верны

- А. Белок СМЖ более 1 гр. на мл указывает на желудочковую обструкцию
- Б. Соответствующая терапия дает отличный прогноз даже у пациентов с выраженной клиникой
- С. Отрицательный кожный тест эффективно исключает диагноз
- Д. Начальные признаки и симптомы острые в большинстве случаев
- Е. Черепные нервы вовлекаются редко

Ответ:А

89-91. 38-ми летняя женщина мать 2 детей, медицинский социальный работник госпитализирована с диагнозом рака груди. Она ожидает хирургию и затем, возможно, радиацию и химиотерапию. С момента прибытия она была требовательной, неприятной и не общительной. Она сильно жаловалась на нянь за их нечувствительность и грубость. Ее муж попытался успокоить нянь, что она не такая, как всегда, но сам ушел, когда жена сказала ему убираться! Няни потребовали психиатрической консультации, чтоб успокоить эту неуравновешенную женщину.

89. Поведение пациентки:

- А. Пограничное расстройство личности
- Б. Результат ПМС
- С. Регрессия и эктинг
- Д. Из-за метастазов в мозг изменения поведения
- Е. Из-за большой депрессии с возбуждением

Ответ:С

90. Злость нянечек можно описать как пример:

- А. Эктинг-ап
- Б. Перенос
- С. Контр-перенос
- Д. Сформированная реакция
- Е. Расщепление

Ответ:С

91. Главная цель псих.оценки женщины:

- А. Определить необходимость в ограничениях
- Б. Определить необходимость перевести ее в другой госпиталь
- С. Установить строгие ограничения на её крики и жалобы
- Д. Помочь ей определиться и рассказать о своих страхах
- Е. Получить информацию о нянях из-за взаимного недовольства пациентки и нянь друг другом

Ответ:Д

92-93. 27-ми летняя женщина жалуется на прогрессирующий гирсутизм лица и интервалы между месячными варьирующие от 26 до 90 дней. Она не принимает лекарств с андрогенным эффектом. Семейный анамнез отриц. на гирсутизм и олигоменорею. АД- норма. У нее нет

галактореи, тазовое исследование в норме, кроме оволосения лобка по мужскому типу. Влагалище содержит гребень (складки) и в шеечном канале присутствует избыточная прозрачная слизь.

92. Диагностический тест:

- А. УЗИ таза
 - Б. Измерение 17-гидроксипрогестерона
 - С. Тест стимуляции АКТГ
 - Д. Тест супрессии дексаметозоном
 - Е. ФСГ сыворотки
- Ответ:Б

93. Тесты в норме. Прولاктин 13 (норма <20). Диагноз:

- А. СПЯ
 - Б. Дефицит 21-гидроксилазы
 - С. Аденома гипофиза
 - Д. Опухоль клеток Сертоли- Лейдига
 - Е. Адреналовая аденома
- Ответ:А

94-96. 52-ух летняя школьная учительница с жалобами на боль, отёчность, покраснение левого бедра. Она только вернулась из spring break, во время которого она вела машину 9 часов чтобы навестить своих родителей. Она курильщик и принимает только таблетки с эстрогеном и прогестероном. Ее витальные функции, включая ЧД- нормальны. В остальном обследование непримечательно.

94. Лучший первый шаг в оценке?

- А. Вентиляционно-перфузионное сканирование
 - Б. Легочная ангиография
 - С. Дуплекс сканирование левой ноги
 - Д. Венограмма
 - Е. Пульсоксиметрия
- Ответ:С

95. После диагностирования тромбоза левой бедренной вены, она получает в/в лечение гепарином. После 5 дней терапии тромб.45000. При приеме они были 375000. Вы устанавливаете гепарин-индуцированную тромбопению. Что верно о этом синдроме?

- А. Он случается через несколько часов после начала дачи гепарина
 - Б. Риск обычно дозозависимый и возрастает с увеличением дозы
 - С. Обычно вызывает значительную тромбопению с тромб.<20000
 - Д. Это IgAAT, к-ые связываются в комплекс с гепарином и тромбоцитарным фактором 4
 - Е. Риск выше при использовании свиного чем бычьего гепарина
- Ответ:Б

96. Наиболее частое осложнение:

- А. Кровотечение
 - Б. Артериальный тромбоз
 - С. DVT
 - Д. Инсульт
 - Е. Кожный некроз
- Ответ:С

97. Чем характеризуется энтеропатический акродерматит?

- А. Дефицит цинка
 - Б. Аутосомно-доминантное наследование
 - С. Гипергонадизм
 - Д. Начало вскоре после рождения у грудничков
 - Е. Запор
- Ответ:А

98. 18-ти месячный мальчик с 2-ух дневной историей перемежающейся рвоты и раздражительности. На физикальном обследовании он выглядит плохо, с переполненностью в правом нижнем квадранте живота и на пеленке стул малиновое желе. Диагноз:

- А. Запор
- Б. Гастроэнтерит
- С. Инвагинация
- Д. Дивертикул Меккеля
- Е. Заворот

Ответ:С

99. 3-х дневный в клинике с запором. Он рожден в срок и через сутки выписан домой. У него не было стула с рождения. Он хорошо сосет грудь и без рвоты. Мать думает что у него метеоризм. На физ. обследовании вес равен весу при рождении. Живот вздут и нет других находок. Д-з:

- А. Дуоденостеноз
- Б. Эзофагеальная атрезия
- С. Функциональный запор
- Д. Б-нь Гиршпрунга
- Е. Недостаточность грудного кормления

Ответ:Д

100. 6-ти месячный в клинике с 1-но дневной историей ректального кровотечения. У него нет боли или дискомфорта и нет другой симптоматики. На физ. обследовании он выглядит хорошо. Обследование живота в норме. На пеленке из дома темно-красная кровь. Д-з:

- А. Фиссура ануса
- Б. Инвагинация
- С. Дивертикул Меккеля
- Д. Аллергия на молоко
- Е. Заворот

Ответ: С

101. 3-х летний мальчик готовится для плановой тонзилэктомии. На дооперационном обследовании была проверена свертываемость, показавшая удлиненное время кровотечения и АЧТВ. Диагноз:

- А. ИТП
- Б. Б-нь Фон- Виллебранта
- С. Классическая гемофилия
- Д. Дефицит факторов 2,5,7,9,10
- Е. Дефицит фактора 9

Ответ:Б

102. Однедельный ребенок прибыл с однодневной историей лихорадки. Он также раздражен и со сниженным аппетитом. Т-39, Он раздражен и плаксив. Диагностика:

- А. ОАК
- Б. ОАК и культура крови
- С. ОАК, ОАМ и культура крови
- Д. ОАК,ОАМ, культура крови и культура мочи
- Е. ОАК,ОАМ, культура крови и мочи, ЛП

Ответ:Е

103. Этиология системной инфекции у этого ребенка:

- А. Стрептококк группы А
- Б. Стрептококк группы В
- С. Гемофилус тип В
- Д. Листерия
- Е. Стафилококк

Ответ:Б

104. Этиология цервикального аденита у 8 месячной девочки

- А. Стрептококк группы А
- Б. Стрептококк группы В

С. Гемофиллус тип В
Д. Пастурелла
Е. Стрептококк
Ответ: А

106. 9-ти летняя девочка с историей рецидивирующего стридора в течение нескольких лет приведена к педиатру. Ребенок не принимал медикаментов некоторое время. Обследование выявило фебрильного ребенка, возбужденного и с периоральным цианозом. Отмечаются движения межреберных и субстернальных промежутков. Дыхательные звуки приглушены и стридор выслушивается билатерально. Первичное лечение

А. В/в аминофиллин
Б. Рентген груди
С. Кромолин небулайзером
Д. ОАК и культура крови
Е. Альбутерол небулайзером
Ответ: Е

107. 4-х летняя девочка через 2 дня после укуса соседской кошкой. Укус на ее кистях, после того как она дразнила кошку. На обследовании 2 точечных укуса с эритемой и индурацией вокруг раны. Возбудитель

А. *Rochalimae henselae*
Б. *Eikenella corrodens*
С. *Pasteurella multocida*
Д. *Francisella tularensis*
Е. *Spirillum minus*
Ответ: С

108. Наиболее частое ограничение центральной тенденции, которая наиболее чувствительна для оценки в примерах, это:

А. Медиана
Б. Средняя величина
С. Модель
Д. Стандартная девиация
Е. Вариация
Ответ: Б

109-110. 45-ти летний мужчина попал в ДТП после сильной пьянки. Он госпитализирован, где ему лечили перелом левого бедра. Через 6 часов после начала терапии у него началась дрожь с тремором. На 3 день развилась четкая картина делирия. Он стал дезориентирован и потлив с Р 120 и АД 220/140. Он видит жутких жуков в комнате на стенах. Какое наиболее частое осложнение абстиненции

А. Генерализованные судороги
Б. Упорный ступор
С. Гипергликемия
Д. Гипернатриемия
Е. Гипермагниемия
Ответ: А

110. Какие из следующих препаратов могут помешать развитию Корсаковского синдрома из энцефалопатии Вернике

А. Глюкоза
Б. Тиамин
С. Лоразепам
Д. Диазепам
Е. Галоперидол
Ответ: Б

111. 68-ми летняя женщина с ХОЗЛ поступила в январе с правосторонней среднедолевой пневмонией. Она живет дома с мужем, 2 кошками 2 птичками. Причина пневмонии

А. Золотистый стафилококк

- Б. Хламидия psittaci
 - С. Грипп
 - Д. Гемофилюс
 - Е. Стрептококк
- Ответ:Е

112. 30-ти летний мужчина верит, что его головные боли- результат воздействия аэрозольных клеев на его работе. Какой вопрос наиболее важный в беседе с ним?

- А. Ухудшаются ли боли при использовании большего кол-ва клея
- Б. Что входит в состав клея?
- С. Если ли у других сотрудников подобная симптоматика?
- Д. Когда начались симптомы?
- Е. Если головные боли в выходные?

Ответ:С

113. Если клинические исследования показали, что препарат А более эффективный чем препарат Б с р-ценностью .02, какое из следующих утверждений лучше описывает результаты?

- А. 2% вероятности что результаты ложные
- Б. 2% вероятности что результат случаен
- С. Вероятность что препарат Б окажется круче- 2%
- Д. Вероятность ошибки типа II- 2%
- Е. Изучение имеет достаточную статистическую силу

Ответ:Б

114. 65-ти летняя женщина с депрессией. Прошлый анамнез- отхождение камня почек месяц назад. Физ. обследование непримечательно. Са12,8, альбумин4,0. ПТГ повышен 328. Причина:

- А. Паратиреоидная аденома
- Б. Паратиреоидная гиперплазия
- С. МЭН1
- Д. МЭНIIа
- Е. Паратиреоидная карцинома

Ответ:А

115. Что об сибирской язве как оружии массового поражения не верно?

- А. Ингаляция спор, затем бессимптомная инкубация 1-6 дней, затем внезапное начало катастрофического заболевания с гемофтизом и смертью
- Б. Споры очень устойчивы и почва естественный резервуар для них
- С. Человек вдохнувший споры маловероятно будет передавать заболевание окружающим
- Д. Выздоровление зависит лишь от проф. иммунизации
- Е. Заболевание лечится доксициклином или ципрофлоксацином при их раннем назначении

Ответ:А

116. Критическое достижение сенсомоторного периода развития считается полным:

- А. Неизменность объекта
- Б. Постоянство объекта
- С. Транзитные объекты
- Д. Выяснение причин до операции
- Е. Конкретные операции

Ответ:А

117-120. У 37-ми летней женщины подозревается множественный склероз. У нее перемежающиеся парестезии обеих ног последние несколько месяцев и сейчас симптомы недержания мочи.

1117. Физ. находка характерная для МС:

- А. Потеря памяти
- Б. Запоры
- С. Внутрядерная офтальмоплегия
- Д. Интенционный тремор
- Е. Билатерально приподнятые большие пальцы ног

Ответ:с

118. Первичная диагностика:

- А. СТ мозга
- Б. ЯМР мозга
- С. ЭЭГ
- Д. Метод вызванных зрительных потенциалов
- Е. Метод вызванных слуховых потенциалов

Ответ:Б

119. Что верно о множественном склерозе?

- А. Мужчины в 2 раза чаще
- Б. Типичный возраст начала 5-6 декада жизни
- С. 80% больных хронически-рецидивирующим течением у которых признаки и симптомы имеют тенденцию развиваться за несколько дней улучшаются неделями
- Д. 50 % больных имеют первично прогрессирующий МС
- Е. Оптический неврит первично билатеральный

Ответ:С

120. Что из следующего полезно для ускорения клинического улучшения у больных с острым рецидивом МС?

- А. Интерферон- бета 1В
- Б. Циклоспорин
- С. Метотрексат
- Д. КС
- Е. Пенициллины

Ответ:Д

121. Какова в США в 2002 году была частота вирусных заболеваний приведших к пересадке печени?

- А. 0,1%
- Б. 1%
- С. 2%
- Д. 3%
- Е. 5%

Ответ:Б

122. 41-о летний мужчина сообщил, что моет руки 50 раз в день. Вечером он проверяет двери, окна и ставни 12 раз перед сном. Он боится цифры 3.

122. Диагноз:

- А. Параноидное расстройство личности
- Б. Параноидная шизофрения
- С. Шизотипальное расстройство личности
- Д. Obsessивно-компульсивный с-м
- Е. Пресенильная деменция

Ответ:Д

123. Лекарство первого выбора для контроля за симптомами у мужчины

- А. Флюоксамин
- Б. Альпрозалам
- С. Бушпирон
- Д. Галопиридол
- Е. Литий

Ответ:А

124. Мужчина хочет знать возможно ли лечиться не фармакологически. В этом случае наилучшим методом лечения будет

- А. ЭСТ
- Б. Поведенческая терапия
- С. Гипноз
- Д. Кратковременная психодинамическая психотерапия

Е. Ни одно

Ответ:Б

125-126. 3-х дневный, рожденный в срок ребенок с прогрессирующей рвотой и вздутием живота. У него отшел меконий в 48 часов с помощью глицериновой свечи. Он не может принимать пищу через рот и последние 12 часов у него снижен диурез

125. Какие мероприятия д.б. осуществлены перед транспортировкой ребенка в региональную педиатрическую больницу

А. Назогастральный зонд и в/в жидкости

Б. Хлориды пота

С. Рентген живота

Д. Культуры мочи и крови перед назначением АБ широкого спектра

Е. Бариевая клизма

Ответ:А

126. По прибытию в больницу наиболее приемлемой диагностикой будет

А. Аноректальная манометрия

Б. Рентген, бариевая клизма с последующей ректальной биопсией

С. УЗИ живота

Д. Хлориды пота

Е. Лапаротомия

Ответ:Б

127. У курильщика уменьшение средней продолжительности жизни 6,6 лет. Каково в среднем изменение продолжительности жизни у алкоголиков

А. +0.3 года

Б. Без изменений

С. -1 год

Д. -5 лет

Е. -20 лет

Ответ:Е

128. Вы провели тест Манту 60 летнему здоровому мужчине из сельской местности США, который хочет работать в госпитале. Между 48 72 часами после теста индурация 6 мм, и вы говорите ему, что результат -. Но через 3 недели тест повторен и индурация 13 мм. Ваши действия

А. Повторить через 2 месяца

Б. Лечить новую инфекцию

С. Считать , что возможно это был эффект ускорения

Д. Культуру на мокроту

Е. Немедленно проверить опять

Ответ:С

129. Стратегия скрининга рака легких

А. Рентген через год у выкуривающего более 50 пачек в год

Б. Рентген груди через год для каждого старше 50 лет

С. Рентген груди каждый год у больного выкуривающего более 50 пачек в год

Д. Рентген груди каждый год для каждого старше 50 лет

Е. Не требуется скрининга

Ответ:Е

130. Побочный эффекты метотрексата:

А. ЗСН

Б. Периферическая нейропатия

С. Депрессия костного мозга

Д. Геморрагический цистит

Е. Кондуктивная тугоухость

Ответ:С

131. Рабочий хочет избежать рецидивов корешковых болей внизу спины. Его работа- обходить конкретный этаж магазина , отправляя посылки весом более 15 фунтов. Рекомендации

- А. Переход на сидячую работу
- Б. Носить пояс при подъеме груза
- С. Использовать обе руки для удержания груза, когда он держит его на вытянутых выпрямленных руках
- Д. Делать легкие растяжения, включая выпрямления спины несколько раз в день
- Е. Ибупрофен 400 мг П.О в день с едой

Ответ:Д

132. 36-ний алкоголик с панкреатической недостаточностью из-за рецидивирующего панкреатита. Он жалуется на ночную слепоту, сниженный вкус пищи и сухую кожу с гиперпигментацией. Эти жалобы предполагают дефицит:

- А. Меди
- Б. Цинка
- С. Селена
- Д. Хрома
- Е. Магния

Ответ:Б

133. Что из следующего вызывает хронический кашель:

- А. ACE- ингибиторы
- Б. Са-блокеры
- С. Фторхинолоны
- Д. НМД-коредуктазы ингибиторы
- Е. Цефалоспорины

Ответ:А

136-137. 52-х летний мужчина с жалобами на головную боль. АД 210/140. На сетчатке геморрагии и отек соска. ЭКГ- ГЛЖ. АМК-56, креатинин-58.

136. На основании чего можно поставить диагноз злокачественной гипертензии:

- А. Уровня СКД
- Б. Уровня ДКД
- С. Головной боли
- Д. Изменения глазного дна
- Е. Размера сердца

Ответ:Д

137. Что является лучшей информацией о прогнозе злокачественной гипертензии

- А. Уровень СКД
- Б. Уровень ДКД
- С. Аномалии почечной функции
- Д. Улучшение в будущем
- Е. Разеры скрдца

Ответ:С

138. 64-х летняя женщина приведена мужем для оценки забывчивости. Она также не может подобрать слова и имеет параноидный бред о соседях. Что наиболее специфично для б-ни Альцгеймера:

- А. Нормальный результат Beck Depression Inventory
- Б. Плохой результат Folstein Mini mental Status Exam
- С. Мягкая мозговая атрофия на СТ мозга
- Д. Быстрый тремор покоя
- Е. Сниженная с 2-х сторон активность париетальных долей на ПЭТ

Ответ:Е

139. Что верно о б-ни Альцгеймера:

- А. Патологические находки включают нейрофибриллярные сплетения и дегенерацию нейронов
- Б. В большинстве случаев четкая наследственная предрасположенность
- С. Кортикальная активность АХЭ снижена

Д. ЭЭГ обычно показывает судорожную активность

Е. Симптомы начинаются до 40 лет

Ответ: А