

**Итоговый экзамен2**

3. 7-ми летняя девочка с 2-ух дневной историей болью в правом ухе. У нее нет лихорадки, застоя или других симптомов. Боль когда Вы смещаете козелок. Отделяемое в правом слуховом проходе, закрывающее барабанную перепонку. Диагноз:

- А. Острый средний отит с перфорацией
- Б. Контактный дерматит
- С. Инородное тело в слуховом проходе

Д. Мастоидит

Е. Наружный отит

Ответ:Е

4. В 2000 году дети до 4-х лет стали получать вместо оральной полиовакцины инъекционную из 4-х доз вакцину. Это изменение отражает тот факт что:

- А. Инъекционная вакцина менее дорогая
- Б. Риск заболеть вакцин-ассоциированным паралитичексим полиомиелитом выше от применения оральной вакцины чем риск заболеть полиомиелитом со штаммом дикого типа
- С. Не было случаев заражения штаммом дикого типа а последние 15 лет
- Д. Инъекционная вакцина больше защищает чем оральная
- Е. Инъекционная вакцина получила широкое распространение во всем мире

Ответ:Б

5. 25-ти летняя женщина, ВИЧ отриц. только что изнасилованная. Она хочет немедленно провести тест на ВИЧ, что Вы и осуществляете. Вы предлагаете тест ELISA, базирующийся на промежутке между инфицированием и появлением определяемых АТ. Через сколько времени тест выявляет АТ после инфицирования?

- А. 2-10 дней
- Б. 5-21 день
- С. 10-30 дней
- Д. 4-12 недель
- Е. 1,5-6 месяцев

Ответ:Е

6. Рабочий жалуется на слабость. Он выглядит анемичным и ОАК выявил анемию, лейкопению и тромбопению. Причина отравления:

- А. Ацетон
- Б. Токсин грибов
- С. Толуин
- Д. Бензин
- Е. Дизельные выхлопы

Ответ:Д

7. Приблизительно какой процент на здоровье затратило правительство США в 1997 году?

- А. 5%
- Б. 10%
- С. 20%
- Д. 30%
- Е. 40%
- Ф. 50%
- Г. 60%

Ответ:Ф

8. Какой из следующих женщин необходимо провести Пап-мазок?

- А. 78-ти летней с 3-мя взрослыми детьми, историей нормальных пап-тестов, и без Пап-теста за последние 5 лет
- Б. 27-ми летней с тотальной гистерэктомией 1 год назад из-за рака шейки
- С. 38-ми летней девственнице, не делавшей Пап-мазок последние 10 лет
- Д. 37-ми летней сексуально активной, с нормальным Пап-мазком каждые 3 года с 20-ти лет и нормальным Папом 1 год назад
- Е. 30-ти летняя сексуально активная с историей нормальных Пап-мазков, с тотальной гистерэктомией из-за фибромиомы матки и не делавшей Папов последние 10 лет

Ответ:Б

9. Процент валового внутреннего продукта США пошедшего на нужды здравоохранения в 1997 году?

- A. 5%
- B. 9%
- C. 11%
- D. 14%
- E. 17%

Ответ:Д

10. Пациент был выписан из отделения. Бухгалтерия ожидала получить 400000 \$ за проведенное лечение. Эту сумму лучше всего отнести к:

- A. Доходной части
- B. Общая прибыль
- C. Зарплата для нужд сотрудников мед. служб
- D. Для бухгалтерии
- E. Долг
- F. Полученное от DRG

Ответ:А

11. Вы разбираете данные с целью выяснить есть ли ассоциация между измерением СКД и ДКД в общей популяции и какова величина этой тенденции. Какие из следующих техник статистического анализа будет наиболее подходящей?

- A. Wilcoxon Two-Group Rank Sum Test
- B. Mann-Whitney U Test
- C. Wilcoxon Signed-Ranks Test
- D. Linear Model of Regression
- E. odds ratio

Ответ:Д

12. 34-х летний мужчина прибыл с лихорадкой, одышкой в госпиталь Чикаго. Рентген груди выявил пневмонию и культура крови выявила стрептококк. Эмпирический антибиотик выбора:

- A. Цефтриаксон
- B. Пенициллин
- C. Ванкомицин
- D. Амоксициллин
- E. Азитромицин

Ответ:А

13. Во время пикника дикая лиса внезапно появилась из леса и напала на молодую женщину укусив ее несколько раз за ногу. Лиса затем продолжала бродить вокруг людей, атаковав ярко одетых людей. Мужчина попытался поймать лису и был укушен несколько раз за кисти и голову. Офицер службы контроля за животными прибыл и успешно изловил лису. Дальнейшие действия:

- A. Наблюдать за лисой 10 дней
- B. Исследовать мозг лисы на бешенство и лечить людей в зависимости от результатов
- C. Начать лечение столбнячным анатоксином
- D. Начать лечение укушенных рабической вакциной
- E. Начать лечение укушенных жертв рабическим Igi вакциной

Ответ:Е

14. 31-о летняя кавказская женщина на 31-й неделе гестации. Она с мужем вычитали в журнале о муковисцидозе и интересуются шансами ребенка заболеть. Никто из них не проверялся на наличие гена б-ни. Вы знаете частота встречаемости гена муковисцидоза у кавказской популяции приблизительно от 1 до 25 лет. Вы скажете ей что вероятность рождения ребенка с муковисцидозом:

- A. 0,т.к. ни у кого из пары нет муковисцидоза
- B. 1 на 50
- C. 1 на 625

Д. 1 на 1350

Е. 1 на 2500

Ответ:Е

15. 17-ти летняя девушка с умеренной дисменореей, начавшейся 1 год назад после менархе. Физ. исследование, включая тазовое обследование- нормальное. Лечение первичной дисменореи:

А. Прозак

Б. Ацетоминофен

С. Бромкриптин

Д. Ибупрофен

Е. Гидрокортизон

Ответ:Д

16. 15-ти летний мальчик с внезапным началом респираторного дистресса. Он учился 1 час назад, когда у него развилась боль в груди и одышка. У нет анамнеза дых. патологии. На физ. обследовании- тахипноэ, умеренное участие в дыхании вспомогательной дых. мускулатуры и сниженные дых. шумы над левыми легочными полями. Д-з:

А. Аспирация инородного тела

Б. Ухудшение астмы

С. Эмпиема

Д. Пневмония

Е. Пневмоторакс

Ответ:Е

17-18. 2-ух недельный мальчик выявил на скрининге серповидноклеточную анемию.

17. Следующий шаг в лечении:

А. Избегать жары

Б. Иммунизация пневмококковой вакциной

С. Фолиевая к-та

Д. Железо

Е. Профилактика пенициллином

Ответ:Е

18. Через 6 месяцев пациент повторно у Вас с 3-х дневной историей лихорадки и летаргии. Также у него ринорея и кашель. На физ. обследовании он бледный, с тахикардией и с массой в левом верхнем квадранте живота. Нв-4, тромбоциты-100000, лейкоциты-15000 с 50% сегментоядерных нейтрофилов. Ретикулоциты 15%. Диагноз:

А. С-м острой боли в груди

Б. Острая секвестрация селезенки

С. Апластический криз

Д. Инвагинация

Е. Вазо-окклюзивный криз

Ответ:Б

19. Отчетливое повышение выживаемости среди случаев, найденных на скрининге может привести к тому, что скрининг увеличит кол-во случаев выявленной патологии, которая медленно прогрессирует и таким образом имеет длительную доклиническую фазу болезни. Это называется:

А. Систематической ошибкой оценки, обусловленной субъективным фактором (bias)- добровольцами

Б. Берксовиеская ошибка

С. Преждевременная ошибка

Д. Диагностическая ошибка

Е. Прогностическая ошибка

Ответ:Е

20-22. 55-ти летний мужчина с острым началом мучительной загрудинной боли и эпигастральной боли с последующим длительным эпизодом рвоты. В анамнезе гипертензия, СД, выкуривание 30 пачек сигарет за год. Витальные функции- АД 90/60, P100, ЧД18,Т100. На

обследовании п/к эмфизема, снижение дыхания слева. На рентгене- пневмомедиастинум и левосторонний гидроневмоторакс. Оставлен дренаж в левую плевральную полость и начата в/в гидратация.

20. Диагноз:

- А. Бронхоплевральный свищ
- Б. Перфорация пищевода
- С. С-м Мэллори-Вайса
- Д. Спонтанный пневмоторакс
- Е. Перфорация желудка

Ответ:Б

21. Диагностика:

- А. СТ
- Б. Эзофагограмма
- С. Анализ плевральной жидкости
- Д. ЭФГДС
- Е. Трахеобронхограмма

Ответ:Б

22. Что более всего повлияет на исход?

- А. Выбор антибиотика
- Б. Время окончательного лечения
- С. Интенсивная терапия
- Д. Ранняя интубация и ИВЛ
- Е. История курения

Ответ:Б

23. Вы анализируете время выживания группы рабочих, некоторые из к-х курильщики. Результаты бимодальны со смещением вправо. Что является лучшим ответом относительно центральной тенденции в этом случае?

- А. Средняя величина обеспечивает лучший индекс центральной тенденции
- Б. Медиана обеспечивает лучший индекс центральной тенденции
- С. Модальность обеспечивает лучший индекс центральной тенденции
- Д. Ни одно
- Е. Все обеспечивают одинаковый результат

Ответ:Д

24. У Вас появился новый тест на рак колона. Вы спрашиваете узаконен ли этот тест. Что Вы имеете в виду?

- А. Точность этого теста сравнивалась с золотым стандартом?
- Б. Чувствительность его сравнивалась с золотым стандартом?
- С. Специфичность сравнивалась с золотым стандартом?
- Д. + и – оценки теста сравнивались с золотым стандартом?
- Е. Подходящестль или законность сравнились с золотым стандартом?
- Ф. Определялась ли воспроизводимость теста?

Ответ:А

25. Что из следующего вызывает тяжелый с-м отмены при внезапном прекращении приема?

- А. Амитриптилин
- Б. Альпразолам
- С. Хлорпромазин
- Д. Бензтропин
- Е. Литий

Ответ:Б

26. Молодая пара собирается провести медовый месяц в Мексике и хочет избежать диареи путешественников. Вы советуете им избегать воды, мороженого, салатов, сырых овощей. Возбудитель:

- А. Шигелла
- Б. Сальмонелла

С. Вибрио парагемолитикус  
 Д. E. coli  
 Е. Кампилобактер  
 Ответ:Д

27-28. Здоровая 23-я женщина на первом пренатальном визите. У нее регулярные месячные с 28-30-ти дневным интервалом. Последние месячные были 1.12.2001.

27. Предполагаемая дата родов:

- А. 24.08.2002
- Б. 1.09.2002
- С. 8.09.2002
- Д. 15.09.2002
- Е. 22.09.2002.

Ответ:С

28. Ей проведено тазовое обследование. Матка на середине расстояния между симфизом и пупком. Срок гестации?

- А. 6 недель
- Б. 12 недель
- С. 16 недель
- Д. 20 недель
- Е. 28 недель

Ответ:Д

30. 21-о летний мужчина для получения информации о ВИЧ и использовании кондома. За последние 3 года у него были периодически половые связи с несколькими разными женщинами. Он уверен, что пользовался кондомами. Он спрашивает помогут ли кондомы при связи с ВИЧ+ партнершей. Что верно о кондомих и ВИЧ?

- А. Если женщина имела частые связи с ВИЧ+ мужчиной (годы), риск передачи вируса при постоянным пользованием кондомом становится равным риску передачи ВИЧ без кондома
- Б. Латексные кондомы менее эффективные чем кондомы с натуральной мембраной в предотвращении заражения ВИЧ
- С. Кондомы с Ноноксилоном-9 в 2 раза эффективнее в защите от ВИЧ по сравнению с другими кондомих
- Д. Умеренность – единственный способ не заразиться ВИЧ
- Е. Смазка с вазелином может повысить вероятность повреждения латексного кондома

Ответ:Е

31. Обеспокоенная мать 13-ти летней девочки сообщает, что дочь поздно ложиться спать, легко становится раздражительной с младшим братом и настаивает на запирании себя в спальне. Она хорошо успевает в школе и в команде по соккеру играет. На физ. обследовании она на стадии 4 по Таннеру и остальные физ. находки в норме. Следующий шаг в лечении:

- А. Проверить функцию щитовидки
- Б. Скриннинг наркотиков в моче
- С. Тест на беременность
- Д. Расспросить о возможном насилии
- Е. Успокоить мать

Ответ:Е

32. 12-ти месячный мальчик поступил после тяжелых генерализованных судорог дома. Трижды рвал и возбужден. Не было судорог в анамнезе и было хорошее здоровье. На обследовании Т40. Он возбужден и не узнает мать. СМЖ: Л.-2000 (98% сегметированных нейтрофилов), протеин155, глюкоза 20. Причина инфекции:

- А. Энтеровирус
- Б. Стрептококк группы А
- С. GBS
- Д. Стрептококк pneumoniae
- Е. БК

Ответ:Д

35. Что из следующего верно относительно кондуктивных расстройств?

- А. Расстройство наблюдается у 15-20% мальчиков и 2-9% девочек до 18-ти лет
- Б. У таких детей низкие уровни плазменного допамина бетагидроксилазы
- С. Нет корреляции между алкоголизмом у родителей и детской заболеваемостью
- Д. Не сочетается с дефицитом внимания
- Е. Средний возраст детей с началом б-ни одинаков у мальчиков и девочек

Ответ:Б

36. Фрейдовская концепция суперЭго описывается как:

- А. Сознательный опыт + и -, грубая аналогия сознательного опыта
- Б. Бессознательное, объединяющее моральные аспекты поведения
- С. Преувеличенное ощущение ч.-л. власти или бессилия
- Д. Внутриспихическая структура чьи действия подчиняются персонально установленным идеалам
- Е. Врожденное и подсознательное запрещение сексуальному выражению

Ответ:Д

57. Здоровая 28-ми летняя женщина начала пренатальные визиты в 8 недель гестации. Нв-13,5. Она начала принимать витамин, содержащий 1 мг фолата за 3 месяца до зачатия, Все о фолате верно, кроме:

- А. Уменьшает риск дефектов нн трубки
- Б. Препятствует развитию макроцитарной анемии
- С. Кол-во д.б. 4мг в день у женщины с ребенком со спина бифида в анамнезе
- Д. Всасывание в кишечнике уменьшается антиконвульсантами
- Е. Это- жирорастворимый витамин

Ответ:Е

71-72. 17-ти летний ранее здоровый подросток жалуется на прямой удар в верхнюю часть живота во время игры в хоккей. Он жаловался на умеренную боль в эпигастрии во время повреждения. Через 48 часов у мальчика прогрессивно нарастающая рвота желчью. По прибытию в больницу живот не вздут с умеренной болезненностью при пальпации в эпигастрии и верхнем правом квадранте. Лаб. данные:Нт-36, Л.-11000, амилаза235.

71. Д-з:

- А. Панкреатит
- Б. Гастрит
- С. Острый холецистит
- Д. Дуоденальная гематома
- Е. Перфорация тонкого кишечника

Ответ:Д

72. Лечение выбора:

- А. Немедленная эксплорация
- Б. Назогастральная декомпрессия и парэнтеральное питание
- С. Ректоободочная гастроэнюстомия
- Д. Антациды и H2 блокеры
- Е. Холецистэктомия

Ответ:Б

73-74. 26-ти летний мужчина жалуется что ему трудно сосредоточится на работе бухгалтера в юридической фирме, т.к. он чувствует потребность мыть руки каждые полчаса дома и на работе. Он моет руки по 5 минут и он находит свои руки морщинистыми и красными. Такое поведение появилось у него в последние 2 месяца. Он боится заразится при пользовании телефоном и другими предметами, к-х касались другие люди.

73. Д-з:

- А. Общая тревожность
- Б. Паническое расстройство без агарофобией
- С. Паническое расстройство с агарофобией
- Д. Специфическая фобия
- Е. Обсессивно-компульсивное расстройство

Ответ:Е

74. Лечение:

- А. Лоразепам
- Б. Флюоксетин
- С. Клоназепам
- Д. Галоперидол
- Е. Рисперидон

Ответ:Б

75-76.

75. Здоровая 28-ми летняя первородка на 28-й неделе гестации с регулярными схватками 7 часов. Шейка раскрыта на 7 см и на 70% сглажена. Предлежащая часть +1. Что верно:

- А. У нее ложные боли при родах
- Б. В латентной фазе она 1-й стадии родов
- С. Она в активной фазе 1-й стадии родов
- Д. Она во 2-й стадии родов
- Е. Она в 3-й стадии родов

Ответ:С

76. При +1 Что лучше описывает положение предлежащей части плода?

- А. Флоттирует над тазовым входом
- Б. Ниже входа над седалищными остями
- С. На уровне седалищных остей
- Д. Ниже седалищных остей и над промежностью
- Е. Видна в промежности при схватках

Ответ:Д

77. 53-х летний мужчина из банка крови с недавно обнаруженным ВИЧ+. Он из Южной Дакоты, хорошо Вам знаком, верит в свою надёжность и сдает кровь ежегодно. За последние 20 лет имел только связи с одной женщиной-женой и никогда не употреблял в/в наркотики или трансфузии. Банк крови использовал тест ELISA для выявления ВИЧ.

Что верно о пациенте?

- А. У него очень низкий риск иметь ВИЧ+. Он должен воздержаться от секса или практиковать безопасный тест ожидая результаты повторного анализа ELISA
- Б. У него очень низкий риск иметь ВИЧ+. Он должен воздержаться от секса или практиковать безопасный тест ожидая результаты повторного анализа Вестерн-блоттинг теста
- С. У него 13 % риска заболеть по данным ELISA. У него очень низкий риск иметь ВИЧ+. Он должен воздержаться от секса или практиковать безопасный тест ожидая результаты повторного анализа ELISA
- Д. У него 13 % риска заболеть по данным ELISA. У него очень низкий риск иметь ВИЧ+. Он должен воздержаться от секса или практиковать безопасный тест ожидая результаты повторного анализа Вестерн-блоттинга
- Е. Ему д.б. немедленно предложена Профилактика после воздействия, начата пока он ожидает результатов теста

Ответ:А

80. Ребенок в состоянии поднять изюминку используя большой палец руки. Он может стоять с поддержкой. Он говорит мама и папа. Он стесняется незнакомых. Он развивается нормально. Возраст?

- А. 6 мес.
- Б. 9 мес.
- С. 12 мес.
- Д. 15 мес.
- Е. 18 мес.

Ответ:Б

81. 2-ух месячный ребенок поступил после судорог дома. Нет истории травмы и ребенок не выглядит больным. При обследовании ребенок афебрилен и очень летаргичный. Вы думаете о возможности насилия над ребенком. Какие физ. находки подтвердят что состояние ребенка вызвано сильной встряской.

- А. С-м Кернига
  - Б. Ригидность шеи
  - С. Западение родничка
  - Д. + корешковые рефлексы
  - Е. Ретинальные гемморагии
- Ответ:Е

82. 9-ти недельный инфант с Нв 9,2. В остальном ОАК нормален. Он без проблем со здоровьем и рожден в срок без осложнений. Что верно о анемии в этом в-сте?

- А. У грудничков типична железодефицитная анемия
- Б. Похоже на врожденную гемоглобинопатию
- С. Интоксикация свинцом
- Д. Физиологическая низшая точка
- Е. Трансфузии д.б. проведены при Нв <10

Ответ:Д

83. Вы хотите определить какой процент взрослых в Вашем окружении курит. Какой метод изучения надо применить?

- А. Контроль случаев
- Б. Врачебное наблюдение
- С. Перекрестный метод
- Д. Клиническая оценка
- Е. Рандомизированное исследование

Ответ: С

84. Вы лечите 35-ти летнего рабочего конвейра с ишиалгией, вторичной к грыже позвоночного диска в L4-5. Он улучшился, несколько смен прошли спокойно. Что является риск факторами для него?

- А. Собрать 20 5-ти фунтовых коробок за час стоя на столе и повторно наклоняясь через стол резко чтобы закрутить болты
- Б. Проверить плотность 15-ти фунтовой металлической детали стоя или сидя за столом и 10 раз в час перенести детали на 10 футов на уровне талии на другой стол
- С. Собрать 3 1-о фунтовых части продолжая сидеть на конвейере и делая ротационные движения в других сходных позициях 2 раза за смену
- Д. Поднятие 10-ти фунтовых ящиков с запчастями с пола без приседания на корточки и перенос их на уровне талии находящийся конвейр раз в минуту
- Е. Освободить его от работы пока он не сможет работать без ограничений

Ответ:Б

87. Все верно о ПАП-мазке, кроме:

- А. Первый мазок д.б. сделан в 18 лет или после первого полового контакта
- Б. Адекватный мазок включает экзоцервикальные и эндоцервикальные клетки
- С. Это скрининг тест
- Д. Надежно выявляет эндометриальный рак
- Е. Цервикальная цитология на жидкостной основе дает меньше ложно+ результатов чем микроскопический слайд

Ответ:Д

88-91. 55-ти летняя женщина с длительной историей шизы на мониторинге препаратов. Годами она получала разные антипсихотики в высоких и низких дозах. Обычно был частичный ответ на терапию. По ее словам она часто высовывает язык и гримасничает. Ее руки и кисти судорожно подрагивают и странная жестикуляция при разговоре. Она постоянно извивается при сидении.

88. Ненормальные движения вызваны:

- А. Ухудшением кататонической шизофрении
- Б. Тардив дискинезией
- С. Акатизией
- Д. Псевдопаркинсонизмом
- Е. Хоресей Ханггинтона

Ответ:Б



89. Уменьшение дозы флюфеназина может первично привести к:

- А. Усилению ненормальных движений
- Б. Ослаблению ненормальных движений
- С. Полному их прекращению
- Д. Без изменений
- Е. Ни одно

Ответ:А

90. Препарат, уменьшающий тики за короткое время:

- А. Бензтропин
- Б. Вит. Е
- С. Пропранолол
- Д. Диазепам
- Е. Ни один

Ответ:Е

91. Соответствующий препарат для длительного лечения пациентки:

- А. Диазепам
- Б. Пропранолол
- С. Клоназепам
- Д. Клозапин
- Е. Вальпроевая к-та

Ответ:Д

94. 6-ти летний мальчик с пурпурой и петехиальной сыпью на ягодицах и нижних конечностях. Он выглядит хорошо и афебрилен, с отёкшим правым коленом. ОАК в норме. Д-з:

- А. ИТП
- Б. СКВ
- С. Менингококкцемия
- Д. Пурпура Шенляйн-Геноха
- Е. ЮРА

Ответ:Д

95. 6-ти недельный мальчик с 5-ти дневной историей прогрессивно нарастающей рвоты. У него запор 2 дня. На обследовании он дегидрирован. Электролиты:Na-136, К-3, Сl-88, HCO<sub>3</sub>-1-36. Диагноз?

- А. Врожденная адrenalная гиперплазия
- Б. Гастроэзофагеальный рефлюкс
- С. Пилоростеноз
- Д. Почечный канальцевый ацидоз
- Е. Гастроэнтерит

Ответ:С

96. 27-ми летний мужчина на псих. экспертизе в тюрьме после попытки самоубийства. Он был арестован за нарушение слова, управления притоном наркоманов и продажу кокаина. Он был в ярости на полицию за ее действия, это 12 или 15-й арест с 15-ти лет. Он чувствует они приехали, чтобы взять его. Он употреблял алкоголь и крэк 12-ти лет, оба родителя также употребляли их. Он доучился до 10-го класса, а затем бросил школу, в чем, по его словам, виноваты учителя и директор. Большую часть школы он был прогульщиком. В последнее время он руководил своим пунктом сбыта наркотиков и говорил с удовольствием о своих детках, к-ые обеспечивали его машинами для магазина и о дилерах, покупавшие партии наркоты. Он сказал,- Мы заботились о каждом. Иногда он слышал голоса, но отрицает депрессию или манию, кроме как после употребления крэка.

Какое нарушение личности у б-го?

- А. Истерическое
- Б. Нарциссическое
- С. Избегающее
- Д. Пограничное

Е. Антисоциальное

Ответ: Е

102-105. 60-ти летняя ранее здоровая женщина готовится к elective резекции колона из-за необструктивного рака сигмы. Она начала жидкую диету за 2 дня до операции. За день до операции были даны орально АБ в дополнение к магнезии. Пациентку вырвало после первой дозы магнезии и она не смогла принять вторую дозу. На операции пациентка получила цефалоспорины в/в. Во время колоноанастомоза была несостоятельность гастроинтестинального анастомоза.

102. Операция может классифицироваться как:

А. Класса 1 чистая

Б. Класса 2 чисто-загрязненная

С. Класс 2 чисто-контаминированная с неадекватной подготовкой кишечника и несостоятельностью анастомоза

Д. Класс 3 контаминированная

Е. Класс 4 грязная

Ответ:Д

Через 36 часов после операции у пациентки постоянный субфебрилитет и умеренное тахипное. При обследовании груди дыхание ослаблено в нижних отделах. Дренажи из живота чистые и сухие. Диурез через катетер адекватный по объему

103. Причина лихорадки

А. Раневая инфекция

Б. Инфекция МПТ

С. Пневмония

Д. Ателектаз

Е. Тазовый абсцесс

Ответ:Д

104. Лечение:

А. Эмпирическая АБ- терапия

Б. Культуры крови, мочи, мокроты с последующей эмпирической АБ- терапией

С. Туалет легких со спирометрией и физиотерапия на грудь

Д. Убрать катетер

Е. СТ живота с ПК дренированием абсцесса

Ответ:С

На 6-й послеоперационный день у пациента нормальная функция кишечника и он устойчив к полной оральной диете. Однако у него развилась высокая лихорадка и жалобы на повышающийся дискомфорт в области раны. При обследовании небольшое кол-во отделяемого из дренажа и рана эритематозная и болезненна.

105. Лечение:

А. Культуры крови, мочи, мокроты, рентген груди и СТ живота

Б. Убрать оральные АБ

С. Культура из дренажа в ране и в/в АБ

Д. Открыть рану, культура раневого содержимого и местный уход за раной

Е. Открыть рану, культура содержимого раны и в/в АБ

Ответ:Д

106. После первого пренатального визита в 8 недель гестации беременная во второй раз женщина сдала культуру из шейки, к-ая была + на GBS. Ее первый ребенок родился в 35 недель, после спонтанного разрыва оболочек и внезапного начала родов. Во время первых родов у нее было несколько эпизодов гипертермии 101.6. Лечение:

А. Орально амоксициллин неделю и повторить культуру через неделю

Б. Повторить культуру на 36-ой неделе гестации и амоксициллин если она +

С. В/в пенициллин в родах

Д. Кесарево сечение

Е. Ничего не делать

Ответ:С

107. 33-х летняя женщина, мать 2 детей, спрашивает вашего совета в выборе контрацептивов. Она и ее партнер не желают больше детей. Оба некурящие, здоровые, взрослые. Они хотят выбрать наиболее надежный метод.

- А. Оральные контрацептивы
- Б. ВМС
- С. Кондомы
- Д. Перевязка труб
- Е. Вазэктомия

Ответ:Е

108. Инкубационный период в инфекционных болезнях это

- А. Интервал между внедрением инфекционного агента и началом клиники
- Б. Интервал между контактом с инфекционным агентом и временем когда становится для окружающих
- С. Интервал между биологическим началом болезни и смертью
- Д. Интервал между внедрением инфекционного агента и началом болезни
- Е. Интервал между инфекционностью и патогенностью

Ответ:А

109. Ребенок обычно достигает 50% своего взрослого роста в возрасте

- А. 6 мес
- Б. 12 мес
- С. 2 года
- Д. 4 года
- Е. 6 лет

Ответ:С

110. У мальчика 8 лет выявлена протеинурия ++ на ОАМ. Диагностика:

- А. АМК и креатинин
- Б. Культура мочи
- С. ВВП
- Д. Повторное ОАМ
- Е. УЗИ почек

Ответ:Д

112. В 1985 году кол-во коек в психбольницах в США было 432000 по сравнению с 57000 в 1995. Сложив полную занятость за оба года:

- А. Частота психоблезней с госпитализацией увеличилась на треть
- Б. Информация недостаточна для подсчета частоты распространенности и заболеваемости психзаболеваниями
- С. Заболеваемость психоблезнями с госпитализациями повысилась на треть
- Д. Заболеваемость психоблезнями с госпитализациями снизилась на треть
- Е. Частота психблезней с госпитализацией снизилась на треть

Ответ:Б

114-116. 8-ми месячная девочка госпитализирована с 3-х дневной историей лихорадки, рвоты, раздражительности. Не было подобных проблем в прошлом. Т-40, умеренно дегидратирована. Ее вырвало дважды во время визита. Л 20000 с 70% нейтрофилов. ОАМ из катетера-плотность 1,030, белок+, следы крови. Микроскопия осадка 0-5 Э, много Л, умеренная бактериурия. Взята культура мочи. Лечение

- А. ТМП-СМТ и прием в офисе на следующий день
- Б. В/м цефтриаксон и прием назавтра в офисе
- С. Госпитализация с в/в гидратацией и АБ
- Д. Дождаться результатов культуры мочи и лечить если они +
- Е. Начать оральную регидратацию в офисе амоксициллин

Ответ:С

115. Культура мочи + на следующий день. Причина инфекции

- А. Эшерихия
- Б. Клебсиелла

С. Гемофиллюс  
 Д. Псевдомонас  
 Е. Зол. Стафилококк  
 Ответ:А

116. Через три недели она в вашем офисе выздоровевшая. Следующий шаг в лечении  
 А. УЗИ почек  
 Б. Цистоуретрограмма  
 С. УЗИ почек и цистоуретрограмма  
 Д. Сканирование почек  
 Е. Не нужны тесты  
 Ответ:С

127-128. У молодого человека развился стридор после съедания омаров и он доставлен через 15 мин с нарушением дыхания.  
 127. Первичное лечение  
 А. Оральный бета-блоклер  
 Б. Местно стероиды  
 С. В/в КС  
 Д. П/к эпинефрин  
 Е. В/м дифенгидрамин  
 Ответ:Д

128. Что из следующего ассоциируется с этим видом гиперчувствительности  
 А. Иммуноглобулин А связанный с мастоцитами и базофильными мембранами  
 Б. Отсроченная кожная сыпь  
 С. Немедленное появление с-мов с самоограниченным разрешением в течение часа  
 Д. Интринсинг- астма  
 Е. Отек гортани и бронхоспазм  
 Ответ:Е

129. 30-ти летний работник проходит аудиометрический тест. Вы отметили, что на правое ухо слух на 10 децибелл меньше, чем на оба-3000 и 4000 Гц. На левое- на 5 Дб меньше, чем 3000 Гц и на 10 Дб меньше 4000 Гц. Вы должны  
 А. Вернуть его на работу с затычками в уши  
 Б. Промыть серные пробки  
 С. Обратиться к ЛОР- врачу, чтоб исключить нейрофибром  
 Д. Предположить недавний средний отит и перпроверить через 2 недели  
 Е. Вызвать терапевта из-за возможности, что ототоксичность повлияла на слух  
 Ответ:А

132. Молодой фермер, работавший с пестицидами , доставлен в больницу с головной болью, рвотой, саливацией, диареей, мышечными фасцикуляциями, трудностями речи. Его одежда сменена, он помыт, ему дан активированный уголь. Что вам осталось сделать в лечении  
 А. Эпинефрин  
 Б. Хелаты  
 С. Спиринолактон  
 Д. Атропин  
 Е. Поддерживающая терапия  
 Ответ:Д

133. Что из следующего в наибольшей мере относится к части Б медицинского ухода  
 А. Это совместная программа федеральная и штатов  
 Б. Классифицирует диагноз и условия в относящиеся к диагнозу группы  
 С. Это возмещение, основанных на источнике, базирующемся на относительной шкале ценностей  
 Д. Соответствует параграфу 19 о социальной безопасности  
 Е. Обеспечивает минимум установок службам по мере необходимости  
 Ответ:С

