

Запитання №13Відповідей: 1021, Коментарів: 0

Хлопчик 6-ти років скаржиться на загальну слабкість, генералізоване свербіння та почервоніння шкіри, гостре підвищення температури тіла до 38°C. З анамнезу: перший день хвороби. Протягом кількох годин після обробки невеликого садна іхтіоловою маззю з'явилися поширені гіперемовані папульозно-уртикарні висипання, що виступають над поверхнею шкіри в ділянці передпліччя, живота, стегон, гомілок. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

79%A. Генералізована кропивниця

8%B. Атопічний дерматит - нейродерміт, період загострення

2%C. набряк Квінке

8%D. Алергічний контактний дерматит

6%E. Токсикодермія

Запитання №15Відповідей: 1003, Коментарів: 0

Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає на атопічний дерматит. Після внутрішньом'язового введення ампіциліну з'явилися відчуття стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне дихання. Який з перерахованих препаратів слід ввести в маніпуляційній негайно?

73%A. Розчин адреналіну підшкірно

25%B. Розчин преднізолону внутрішньовенно

2%C. Розчин еуфіліну внутрішньовенно

1%D. Розчин строфантину внутрішньовенно

1%E. Розчин тавегілу внутрішньовенно

Запитання №17Відповідей: 964, Коментарів: 0

Хлопчику 12 років. Знаходиться в клініці з приводу цукрового діабету в фазі декомпенсації. Отримав перед сніданком 10 ОД і перед обідом 6 ОД простого інсуліну. Через 30 хвилин після обіду хлопчик втратив свідомість, з'явилися судоми. Об'єктивно: шкіра волога, бліда, тризм щелеп. Тони серця приглушені, Рс- 100/хв., слабого наповнення, АТ- 90/50 мм рт.ст., дихання поверхневе, 28/хв. Першочергова допомога в даній ситуації включає:

85%A. Введення глюкози

2%B. Оксигенотерапія

5%C. Введення преднізолону

9%D. Введення інсуліну

2%E. Введення мезатону

Запитання №18Відповідей: 951, Коментарів: 0

Дівчинка 4-х років скаржиться на загальну слабкість, кашель. Вночі раптово підвищилася температура до 39,8°C, хвора стала неспокійною. Гавкаючий кашель, шумне свистяче дихання з втягуванням над- та підключичних западин, міжреберних проміжків, шкіра бліда. Контактувала з хворими на ГРВІ сестрами. Що необхідно призначити дитині в першу чергу?

80%A. Преднізолон, гарячі ніжні ванни

7%B. Дибазол, еуфілін

5%C. Папаверин, вітамін С

6%D. Антибіотики, димедрол

5%E. Астмопент, діазолін

Запитання №33Відповідей: 805, Коментарів: 0

У дитини 9-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні ознаки дегідратації III ступеня, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який попередній діагноз?

- 78%А. Гіперосмолярна кома
- 8%B. Діабетична кетоацидотична кома
- 13%С. Гіпоглікемічна кома
- 1%D. Пухлина головного мозку
- 2%E. Енцефаліт

Запитання №34Відповідей: 799, Коментарів: 0

У дитини 8-ми років підвищення температури до 39°C, нежить зі значними гнійними виділеннями, вологий кашель, кон'юнктивіт з гнійними виділеннями, світлобоязнь. На слизовій оболонці щік білуваті ділянки висівкоподібно злушеного епітелію. Який найбільш імовірний діагноз?

- 86%А. Кір
- 2%B. Корова краснуха
- 10%С. Скарлатина
- 2%D. Висипний тиф
- 2%E. Грип

Запитання №35Відповідей: 794, Коментарів: 0

У дитини 4-тижневого віку через 2 тижні від початку захворювання, що проявляється блюванням 'фонтаном', вираженою гіпотрофією і ексікозом, педіатр припустив вроджений пілоростеноз. При надходженні до дитячого відділення стан вкрай важкий: риси обличчя загострені, адинамія, сильна спрага, анурія, запах сечі з рота, сірість шкірних покривів. У сироватці крові: натрій -135 моль/л, калій - 3,7 ммоль/л. Коматозний стан якого характеру розвинувся у дитини?

- 71%А. Гіпохлоремічна кома
- 11%B. Азотемічна кома
- 10%С. Кетоацидотична кома
- 8%D. Гіперосмолярна кома
- 3%E. Гіпоглікемічна кома

Запитання №42Відповідей: 747, Коментарів: 0

Дитині 6-ти років, оперованій з приводу розлитого перитоніту, в процесі забезпечення анестезіологічного засобу, проводиться штучна вентиляція легень у режимі помірної гіпервентиляції. На яких цифрах необхідно підтримувати рівень рСО<sub>2</sub> у КЛС-грамі?

- 72%А. 30-35 мм рт.ст.
- 7%B. 20-25 мм рт.ст.
- 16%С. 35-40 мм рт.ст.
- 6%D. 40-45 мм рт.ст.
- 2%E. 50-55 мм рт.ст.

Запитання №43Відповідей: 749, Коментарів: 0

Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого спостерігаються м'язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці Т). Які біохімічні зміни викликають ці порушення?

- 67%А. Гіперкаліємія
- 26%В. Гіпокаліємія
- 3%С. Гіперкальціємія
- 4%D. Гіпокальціємія
- 2%Е. Ацидоз

Запитання №49Відповідей: 730, Коментарів: 0

У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після травми. При надходженні АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити -  $2,5 \cdot 10^{12}/л$ , НЬ- 60 г/л. Раніше при переливанні цільної крові була анафілактоїдна реакція. Який препарат крові найбільш безпечний для корекції крововтрати?

- 84%А. Відмиті еритроцити
- 1%В. Цільна кров
- 7%С. Еритроцитарна маса
- 1%D. Лейкоконцентрат
- 10%Е. Свіжозаморожена плазма

Запитання №58Відповідей: 677, Коментарів: 0

В клініку дитячої хірургії надійшов хлопчик 6-ти місяців у важкому стані через 36 годин після початку захворювання з клінікою інвагінації кишечника. В сім'ї у дитини дідусь та батько хворіють на гемофілію. Дитині показане негайне оперативне втручання. Яка передопераційна підготовка повинна проводитися хворому?

- 83%А. Переливання препаратів крові та криопреципітату
- 3%В. Інфузійна терапія сольовими розчинами
- 9%С. Інфузійна терапія з використанням колоїдних розчинів
- 6%D. Гемостатична терапія під час втручання
- 2%Е. Переливання плазми після оперативного втручання

Запитання №63Відповідей: 664, Коментарів: 0

Хлопчик 11-ти років госпіталізований до реанімаційного відділення у зв'язку з непритомністю на спортивному майданчику. В анамнезі - епізоди непритомностей, болі у грудях при фізичному навантаженні. Об'єктивно: пульс двогорбий, посилення верхівкового поштовху серця, вислуховується третій тон порушення серцевого ритму. ЕКГ: поліморфні шлуночкові екstrasистоли. ЕхоКС - асиметрична гипертрофія міжшлуночкової перегородки. Який шок має місце у дитини?

- 94%А. Кардіогенний шок
- 1%В. Септичний шок
- 1%С. Анафілактичний шок
- 2%D. Травматичний шок
- 5%Е. Гіповолемічний шок

Запитання №64Відповідей: 664, Коментарів: 0

Дитина 15-ти років доставлена непритомною до приймального відділення бригадою швидкої допомоги у супроводі батьків. Хворий потребує негайної допомоги і госпіталізації у ВРІТ. Чи потрібно лікарю отримати згоду на медичне втручання?

- 88%А. В даному випадку згода не потрібна

- 4%В. Лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові в доступній формі методи і об'єм медичного втручання
- 6%С. Батьки мають право вибору методів медичного втручання
- 3%D. Медичне втручання особам від 15 до 18 років проводиться за їх згодою
- 1%Е. Батьки можуть відмовитись від надання допомоги

Запитання №71Відповідей: 637, Коментарів: 0

У хлопчика 15-ти років раптово підвищилася температура тіла до 39,8°C, виник біль у горлі під час ковтання. На другу добу на обличчі, шиї, верхній частині тулуба на тлі гіперемованої шкіри тулуба виник дрібнокрапковий розеольозний висип з блідим носогубним трикутником. Який найбільш імовірний діагноз?

- 81%А. Скарлатина
- 9%В. Кір
- 8%С. Краснуха
- 2%D. Інфекційний мононуклеоз
- 3%Е. Вітряна віспа

Запитання №75Відповідей: 641, Коментарів: 0

У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати слід призначити дитині?

- 80%А. Стрептоміцин або хлорамфенікол
- 6%В. Пеніцилін або цефотаксим
- 3%С. Бісептол або сульфален
- 3%D. Гентаміцин або нетроміцин
- 10%Е. Тетрациклін або доксициклін

Запитання №80Відповідей: 630, Коментарів: 0

У новонародженої дитини на третю добу життя з'явилися ознаки шлунково-кишкової кровотечі (блювання з домішками крові, мелена), постгеморагічної анемії. З якого розчину слід розпочати парентеральне лікування геморагічного синдрому у дитини?

- 77%А. Свіжозаморожена плазма
- 4%В. Глюкозо-сольовий розчин
- 4%С. Реополіглюкін
- 5%D. Тромбоцитарна маса
- 12%Е. Амінокапронова кислота

Запитання №81Відповідей: 624, Коментарів: 0

Бригаду швидкої допомоги викликано на місце пожежі, де було виявлено дитину 5-ти років з ознаками опіків на обличчі. Об'єктивно: диспное, захриплість голосу, стрідор. Перелом великогомілкової кістки. Ознаки наростаючої гіпоксемії з метаболічним ацидозом. Яка лікарська тактика?

- 97%А. Термінова госпіталізація до ВРІТ
- 1%В. Амбулаторне лікування
- 1%С. Спостереження дільничного педіатра
- 3%D. Лікування в опіковому відділенні
- 1%Е. Звертання в травмпункт

Запитання №82Відповідей: 618, Коментарів: 0

Хлопчик 10-ти років знаходиться на лікуванні з приводу бронхіальної астми. Вранці хлопчик встав з ліжка і раптово з'явилися загальна слабкість, запаморочення, блідість шкіри, холодний піт, шум у вухах, хворий впад. Об'єктивно: зіниці розширені, тони серця різко ослаблені, пульс ниткоподібний, ЧСС- 65/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

- 61%A. Непритомність
- 8%B. Серцева недостатність
- 16%C. Кардіогенний шок
- 1%D. Бактеріальний шок
- 16%E. Інфекційно-токсичний шок

Запитання №84Відповідей: 602, Коментарів: 0

Дитина 5-ти років скаржиться на лихоманку, пронос, блювання та запаморочення. У крові: Нт- 0,55, Na+- 118 ммоль/л, K+- 5,9 ммоль/л. Які розлади водно-електролітного балансу спостерігаються?

- 69%A. Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія
- 12%B. Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліємія
- 14%C. Ізотонічна дегідратація, гіперкаліємія
- 5%D. Гіперкаліємія
- 2%E. Розладів водно-електролітного балансу немає

Запитання №85Відповідей: 605, Коментарів: 0

У дворічного хлопчика сплутана свідомість, невпинне блювання кров'ю, мелена, глибоке шумне дихання, печінка +6 см з-під краю реберної дуги. З'явилися судоми. Стан погіршився декілька годин тому. В анамнезі - з приводу застуди впродовж трьох днів дитина отримувала по дві таблетки ліків на день. Який лікарський засіб міг викликати такі побічні явища?

- 73%A. Аспірин
- 8%B. Бісептол
- 14%C. Парацетамол
- 4%D. Анальгін
- 4%E. Ампіцилін

Запитання №86Відповідей: 594, Коментарів: 0

Пологи у 36 тижнів. Вагітність перебігала на тлі загрози переривання у 28 тижнів, гострої респіраторної вірусної інфекції у 24 тижні. Навколоплідні води світлі. Новонароджена дівчинка з масою 2400 г, довжиною 45 см. При народженні самостійне дихання відсутнє, м'язовий тонус значно знижений. Після проведення штучної вентиляції легенів за допомогою маски та мішка 100% киснем впродовж 30-ти секунд самостійне дихання не відновилося, частота серцевих скорочень складає 50/хв., зберігається акроціаноз. Яка подальша тактика лікаря?

- 62%A. Непрямий масаж серця
- 8%B. Киснева допомога вільним потоком
- 18%C. Санація верхніх дихальних шляхів
- 13%D. Введення адреналіну
- 1%E. Корекція гіповолемії

Запитання №91Відповідей: 583, Коментарів: 0

У доношеної дитини на 2 день життя діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого по Rh-фактору, жовтянична форма. Через 10 години після народження з'явилась субіктеричність шкірних покривів. Розпочато фототерапію, рівень білірубіну сироватки крові - 160 мкмоль/л, через 4 години - 200 мкмоль/л. Яку тактику слід обрати?

90%А. Операція замінного переливання крові

5%В. Інфузійна терапія

3%С. Продовжити фототерапію

2%D. Медикаментозна терапія

2%E. Спостереження

Запитання №99Відповідей: 571, Коментарів: 0

Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди?

79%А. Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною

15%В. Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою

2%С. Косинкова пов'язка на праву верхню кінцівку

3%D. Знеболювання, спроба вправлення вивиху

3%E. Восьмиподібна пов'язка на правий ліктювий суглоб

Запитання №108Відповідей: 538, Коментарів: 0

При наданні невідкладної допомоги дитині із крововтратою до 10% ОЦК лікарю необхідно відновити обсяг циркулюючої плазми. Оберіть оптимальний препарат:

50%А. Ізотонічний сольовий розчин

42%В. Свіжозаморожена плазма

7%С. Реополіглюкін

3%D. Цільна кров

1%E. Розчин глюкози

Запитання №109Відповідей: 532, Коментарів: 0

У дитини 12-ти років з нервово-артритичним діатезом після вживання в їжу значної кількості м'яса з кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу з домішками крові. Найбільш імовірна причина гематурії?

80%А. Ниркова колька

11%В. Гострий гломерулонефрит

3%С. Геморагічний цистит

4%D. Нефритичний синдром

4%E. Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів

Запитання №114Відповідей: 520, Коментарів: 0

Хлопчик у віці 6 місяців хворіє на тяжку форму кашлюка: число нападів кашлю становить 25, напади тяжкі, тривалістю до 10 хвилин, мають 6-8 репризів, закінчуються блюванням. Один з нападів кашлю призвів до апное. Які невідкладні дії?

83%А. Штучне дихання (в ручному режимі)

5%В. Седуксен в/м

1%С. Лобелін в/м

6%D. Налагодити подачу кисню

7%Е. Преднізолон в/м

Запитання №118Відповідей: 518, Коментарів: 0

Дівчинка 2-х місяців з ознаками гіпотрофії знаходилася на грудному вигодовуванні матір'ю, що страждала на полінаркоманію. Після припинення вживання опіатів терміном на 3 місяці вона знову ввела собі звичну дозу внутрішньовенно. Після годування груддю дитина стала кволою, зблідла, дихання 10-12/хв. За медичною допомогою мати не зверталась. Через 40 хвилин у дитини виникло припинення крово- обігу, яке призвело до біологічної смерті. Який тип дихальної недостатності спричинив смерть немовляти?

84%А. Центральний

11%В. Нервово-м'язовий

1%С. Торакоабдомінальний

4%D. Рестриктивний

3%Е. Констріктивний

Запитання №126Відповідей: 509, Коментарів: 0

Народилась недоношена дитина, геста-ційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини відмічається порушення стану, судомна готовність. Виберіть першочергову допомогу для дитини:

59%А. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг

9%В. Фенобарбітал, 20 мг/кг

7%С. 25% розчин  $MgSO_4$ , 1мл/кг

17%D. 5% розчин глюкози, 4 мл/кг

11%Е. 0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг

Запитання №142Відповідей: 497, Коментарів: 0

У новонародженої дитини, яка народилась в асфіксії помірного ступеня, після тактильної стимуляції шкіри вздовж хребта спонтанне дихання не з'явилося. Які подальші дії у пологовому залі треба виконати?

93%А. Почати штучну вентиляцію легень за допомогою мішка і маски

4%В. Похлопати по п'ятах

1%С. Зрошування холодною водою

3%D. Поплескування по підшві

2%Е. Повторити погладжування вздовж хребта

Запитання №146Відповідей: 498, Коментарів: 0

Необхідно провести електричну дефібриляцію дитині з фібриляцією шлуночків. Маса тіла становить близько 10 кг. Оберіть вірну потужність розряду для першої дефібриляції:

71%А. 20 Дж

9%В. 4 Дж

7%С. 40 Дж

13%D. 5 Дж/кг

3%Е. 80 Дж

Запитання №175Відповідей: 467, Коментарів: 0

У дитини 3-х років, яка знаходиться у стаціонарі, на фоні гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла -38,5оС. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, ЧСС- 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний?

62%A. Ацетонемічний стан

3%B. Цукровий діабет

7%C. Гострий апендицит

24%D. Гострий гастроентерит

7%E. Діабетична кома

Буклет осінь 2016 року

Запитання №176Відповідей: 465, Коментарів: 0

Відразу після народження немовля нерухоме, синє і не дихає. Відповіді на тактильну стимуляцію немає, ЧСС становить 40/хв. Який із перерахованих заходів найімовірніше відновить нормальний спонтанний серцевий ритм?

40%A. Штучна вентиляція легень

13%B. Введення адреналіну

39%C. Непрямий масаж серця

7%D. Введення атропіну

3%E. Додаткова тактильна стимуляція

Запитання №177Відповідей: 463, Коментарів: 0

В приймальне відділення звернулися батьки з хлопчиком 8-ми років після укусу бджоли.

Об'єктивно: виражений набряк у ділянці верхньої щелепи з обох боків, верхньої губи, гіперемія і свербіж. Який найбільш імовірний діагноз?

85%A. Набряк Квінке

1%B. Атопічний дерматит

2%C. Кропив'янка

13%D. Анафілактичний шок

1%E. Стрептодермія

Запитання №178Відповідей: 466, Коментарів: 0

Ви надасте допомогу постраждалій дитині з електротравмою. Постраждалий непритомний, тримається за електричний провід. З чого необхідно починати надавати допомогу?

97%A. Звільнити постраждалого від дії електричного струму

1%B. Провести непрямий масаж серця

1%C. Провести ШВЛ

1%D. Дати понюхати нашатирний спирт

3%E. Викликати швидку допомогу

Запитання №188Відповідей: 464, Коментарів: 0

Під час дорожньо-транспортної пригоди постраждала дитина віком 10 років. Через 15 хвилин лікар швидкої допомоги поставив діагноз: відкритий перелом лівої стегнової кістки в нижній третині із зміщенням, артеріо-венозна кровотеча. Травматичний шок II ступеня. Яка невідкладна первинна допомога?

80%A. Зупинка кровотечі

4%B. Накладання асептичної пов'язки

5%C. Транспортна іммобілізація

1%D. Новокаїнова блокада

13%E. Знеболювання

Запитання №189Відповідей: 461, Коментарів: 0

У дівчинки 3-х років з тетрадою Фалло раптово виник напад, дитина стала неспокійною, підсилалась задишка. Об'єктивно: різкий ціаноз, ослаблений II тон над легеневою артерією, грубий систолічний шум у третьому-четвертому міжребер'ї зліва, втрачає свідомість, з'являються судоми. Який стан виник у хворої?

71%A. Задишково-ціанотичний криз

2%B. Пневмоторакс

7%C. набряк легень

11%D. Тромбоемболія легеневої артерії

11%E. Колапс

Запитання №193Відповідей: 454, Коментарів: 0

У дитини 8-ми місяців раптово виникла обструкція верхніх дихальних шляхів, що спричинена стороннім тілом. Візуально стороннє тіло не видно. Назвіть порядок надання невідкладної допомоги в цьому випадку:

92%A. В позиції "вершника" з головою, що опущена нище тулуба, по спині між лопатками виконати 4 удари проксимальною частиною долоні

3%B. Очистка пальцем верхніх дихальних шляхів

3%C. Натискання на живіт

2%D. Очистка верхніх дихальних шляхів за допомогою пінцета Меджилла

2%E. Очистка верхніх дихальних шляхів за допомогою зажима Келлі

Запитання №194Відповідей: 463, Коментарів: 0

У відділення реанімації бригадою швидкої допомоги доставлена дитина 3-х років у непритомному стані. Під час проведення штучного дихання та непрямого масажу серця на ЕКГ реєструється шлуночкова брадикардія 50/хв. Якому із медикаментозних заходів необхідно надати перевагу?

52%A. Внутрішньовенне введення атропіну

1%B. Електрична дефібриляція серця

3%C. Внутрішньовенне введення гідрокарбонату натрію

20%D. Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну

27%E. Внутрішньовенне введення адреналіну

Запитання №195Відповідей: 452, Коментарів: 0

Загальний стан доношеної новонародженої дитини середньої тяжкості, що зумовлено асфіксією середнього ступеня важкості. Маса при народженні 3500 г, довжина 54 см. Оцінка за шкалою Апгар на 1 хвилині 4 бали. Після проведення первинної реанімаційної допомоги з'явилося самостійне дихання, ЧСС- 110/хв., акроціаноз. Яка подальша дія лікаря у даній ситуації?

47%A. Додаткова оксигенація

8%B. Інтубація трахеї

5%C. Штучний масаж серця

30%D. Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів

13%E. Допоміжна вентиляція легенів